

Vurdering af dyrs transportegnethed

Mette S. Herskin, Kirstin Dahl-Pedersen, Matt Denwood, Katrine Kop Fogsgaard,
Björn Forkman, Charlotte Gaillard, Hans Houe, Vibe Pedersen Lund,
Liza Rosenbaum Nielsen, Nina Dam Otten, Karen Thodberg og Peter T. Thomsen



Foto: Kirstin Dahl-Pedersen, AU

Forord

Jævnfør projektbeskrivelsen er forskningsprojektet ”Vurdering af dyrs transportegnethed” en del af Veterinærforlig II. Projektet løber, som det fremgår af samarbejdsaftalens bilag 2 (BH-2013-29), fra 2013-2016 med det overordnede formål at etablere viden om transportegnethed hos produktionsdyr – fjerkræ, kvæg og svin – en viden, der skal fokusere på relevante problemstillinger i regi af Transportforordningen (EU, 1/2005). Projektet omhandler dyregrupper, som enten transporteres i stort antal eller anses for særligt udsatte i forbindelse med transportegnethed, og inddrager såvel yngre slagtedyr (slagtekyllinger) som udsætterdyr (malkekøer og slagtesøer). Ved transportegnethed forstås om et dyr (et individ eller i nogle tilfælde en gruppe af dyr) vurderes i stand til at gennemføre en given transport uden at lide overlast. I projektet søges faser i transporten, som er relevante i regi af Transportforordningen (f.eks. på- og aflæsning, selve kørslen og pauser deri), inddraget. Forskningen retter sig således mod egenskaber ved individer samt mod miljøforhold, der kan have indvirkning på alle dyr i en transport.

Projektet, der gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet (KU), er opdelt i tre delprojekter, hvert med fokus på sin dyregruppe. I projektperioden har styregruppen for Videntcenter for Dyrevelfærd (ViD) fungeret som projektstyregruppe og løbende godkendt justeringer i delprojekternes indhold, omfang og delmål. Nedenstående afrapportering tager udgangspunkt heri, og ikke i de oprindelige formuleringer. I denne samlede rapport gennemgås hvert delprojekt for sig, inklusiv et kort baggrundsafsnit, gennemgang af formål, materialer og metoder, resultater, diskussion heraf samt konklusion.

Fra projektgruppens side ønsker vi at takke de involverede besætninger, vognmænd og chauffører, samt projektets teknikere. Uden jer var disse unikke datasæt aldrig blevet indsamlet. Vi vil gerne takke alle medlemmer af forskningsprojektets interessentgruppe for sparring, gode råd, hjælp og kommentarer, især i projektets etableringsfase. I forbindelse med Delprojekt 1 takkes de involverede fjerkræslagterivirksomheder for åbenhed ved vores slagteribesøg og for hjælp til opklaring af uklarheder i datasættet fra KIK-databasen samt praktisk fortolkning af resultaterne. Lyngsøe Systems A/S takkes for udtræk af datasættet og ligeledes for hjælp til beskrivelse af de mange variable. Desuden vil vi gerne takke Jens Peter Christensen, KU, for faglig sparring under dataediteringsfasen.

I såvel Delprojekt 2 som 3 er data indsamlet på Danish Crowns slagterier. Vi vil gerne takke Danish Crown for et konstruktivt samarbejde samt for at stille områder til rådighed på slagterierne, så dyrene kunne gennemgå kliniske undersøgelser efter transporten. Danish Crown takkes endvidere for at stille GPS-data til rådighed for Delprojekt 3 og Ejerservice for stor hjælp i forbindelse med planlægning og koordinering af de enkelte transportture. Endvidere vil vi gerne rette tak til Institutleder Klaus Lønne Ingvarsen, AU, for en afgørende indsats i forbindelse med projektets opstart. Sidst, men ikke mindst ønsker vi at takke Fødevarestyrelsens kontrollerende dyrlæger i henholdsvis Holsted og Skærbæk, Fødevarestyrelsens Kontor for Dyresundhed, samt Dyreforsøgstilsynet, for et godt og konstruktivt samarbejde omkring projektets gennemførsel og de nødvendige juridiske tilladelser hertil.

Nærværende afrapportering til Fødevarestyrelsen er samlet af projektleder Mette S. Herskin på vegne af de involverede forskere og omfatter følgende tre kapitler: 1) Delprojekt 1: Transportegnethed hos slagtekyllinger; 2) Delprojekt 2: Transportegnethed hos malkekøer; og 3) Delprojekt 3: Transportegnethed hos slagtesøer.

Indhold

Delprojekt 1: Transportegnethed hos slagtekyllinger	4
Dansk resume	4
Summary	5
Baggrund	6
Formål	7
Materialer og metoder.....	7
Resultater	11
Diskussion	17
Konklusion	24
Referencer	24
Bilag til Delprojekt 1	28
Delprojekt 2: Transportegnethed hos malkekøer	58
Dansk resume	58
Summary	59
Baggrund	61
Formål	61
Materialer og metoder.....	62
Resultater	65
Diskussion	69
Konklusion	71
Referencer	72
Bilag til Delprojekt 2	74
Delprojekt 3: Transportegnethed hos slagtesøer	80
Dansk resume	80
Summary	81
Baggrund	83
Formål	84
Materialer og metoder.....	84
Resultater	91
Diskussion	101
Konklusion	104
Referencer	104
Bilag til delprojekt 3.....	107

Delprojekt 1: Transportegnethed hos slagtekyllinger

Vibe Pedersen Lund, Liza Rosenbaum Nielsen, Matt Denwood, Nina Dam Otten og Björn Forkman

Dansk resume

Der transporteres årligt ca. 100 millioner slagtekyllinger til danske slagterier. På trods heraf har risikofaktorer for dødelighed i forbindelse med transport, ikke tidligere været undersøgt i Danmark. Formålene med Delprojekt 1 var derfor:

- 1) at afdække risikofaktorer for høj forekomst af dødelighed ('% dead-on-arrival', DOA) hos konventionelt opdrættede slagtekyllingeflokke transporteret til danske slagterier
- 2) at undersøge, hvorvidt registerdata kan bruges til at forudsige høj DOA-% før transporten, for derved at muliggøre forebyggende tiltag.

Et datasæt dækkende mere end 95 % af alle kyllinger slagtet i Danmark i perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2014 blev rekvireret fra Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen (KIK)-databasen involverende data fra rugerier, opdrætsperiode, fangerhold, transportører, slagteripersonale og veterinærkontrol. Klimadata blev rekvireret fra DMI. Efter dataeditering indgik i alt 14.515 slagtekyllingeflokke transporteret fra 356 huse på 155 CHR-numre til tre fjerkræslagterier i analyserne (82 % af det oprindelige datasæt). Høj DOA-% blev defineret som de 15 % højeste forekomster (DOA-% over 0,342 %), svarende til ca. 100 døde kyllinger ud af en flok på 30.000 individer. Datasættet blev opdelt per slagtegruppe (delslagtede, tidligere delslagtede eller ikke-delslagtede flokke) til risikofaktoranalyse, og per slagteri og slagtegruppe til prædiktionsanalyse, og blev efterfølgende analyseret med generaliserede hierarkiske regressionsmodeller.

Den gennemsnitlige DOA-% per flok var 0,27 % med en markant årstids- og slagterivariation.

De vigtigste risikofaktorer for høj DOA-% var: omgivelsernes temperatur ($<0^{\circ}\text{C}$ og >15 eller $>20^{\circ}\text{C}$ afhængig af slagtegruppe), afstand fra besætningen til slagteriet, hvilket slagteri flokken blev transporteret til samt lastetætheden ($\leq 160 \text{ cm}^2/\text{kg}$). Længere afstand mellem besætning og slagteri var forbundet med øget sandsynlighed for høj DOA-% ved temperaturer under 15°C , hvorimod kort afstand var forbundet med høj DOA-% i varmere vejr ($>15^{\circ}\text{C}$) for såvel delslagtede som ikke-delslagtede flokke.

Andre mindre betydende risikofaktorer var: længere ventetid på slagteriet, højere middelvindhastighed og ankomsttid på slagteriet. Effekten af middelvindhastighed og ankomsttid på slagteriet blev dog kun fundet i ikke-delslagtede flokke. Besætningsfaktorer forbundet med høj DOA-% i nogle af analyserne var: yngre forældreflokke, højere gennemsnitlig daglig tilvækst, ratio mellem % selvdøde og % aflivede kyllinger på over 1,25, revaccination mod infektiøs bronkitis, højere % kyllinger kasseret af sygdomsmæssige årsager, højere % undermålerkyllinger, $>0,05$ % døde kyllinger i huset før indfangning.

Overordnet peger resultaterne på, at karakteristika ved transporten i højere grad end ved besætningen/kyllingerne har betydning for, om en flok registreres med høj DOA-%. Fund af variation på CHR-niveau for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede flokke tyder dog på, at andre managementfaktorer, end de der var tilgængelige i KIK, også har betydning.

Prædiktionsmodellerne indeholdt omgivelsernes temperatur, afstand fra besætning til slagteri, middelvindhastighed, ankomsttidspunkt til slagteri og gennemsnitlig DOA-% for de tre seneste flokke leveret fra samme hus, vægtet forskelligt i hver model. Modellerne resulterede i mange fejlklassifikationer, når den prædikterede sandsynlighed for høj DOA-% i 2014 blev beregnet ud fra modeller baseret på data fra 2011-2013. Som følge af usikkerhederne skal den beregnede prædikterede sandsynlighed for høj DOA-% fra de fire modeller fortolkes og bruges varsomt. Det konkluderes, at et risikovurderingssystem bygget på de fire modeller vil resultere i korrekt udpegning af få højrisiko-flokke, og samtidig medføre mange fejlklassificeringer.

Summary

In Denmark, approximately 100 million broilers are annually transported to slaughter. Risk factors for Danish broilers being registered as dead-on-arrival (DOA) in the slaughterhouse have not previously been investigated. The objectives of this study were:

- 1) to identify risk factors for high DOA-% in conventionally reared broiler flocks transported to Danish slaughterhouses;
- 2) to investigate if register data can be used to predict high DOA-% prior to transport in order to allow for preventive measures.

A dataset covering more than 95 % of all broilers slaughtered in Denmark between January 1st 2011 and December 31st 2014 was received from the Danish Quality Assurance System in the Broiler Production (KIK) database, including data from hatcheries, producers, catching crews, drivers, slaughterhouse personnel and veterinary authorities. Meteorological data was received from the Danish Meteorological Institute. After editing, the dataset contained 14,515 broiler flocks transported from 356 houses on 155 farms to three slaughterhouses (82 % of the original dataset). High DOA-% was defined as the 15 % highest DOA-% observed (i.e. >0.342 %), equivalent to approximately 100 DOA broilers in a flock of 30,000 birds. The dataset was subsetting based on flock type (thinning, previously thinned or not thinned) for risk factor models and on slaughterhouse and flock type for prediction models and analysed using generalized hierarchical regression models.

The average DOA-% per flock was 0.27 % subject to seasonality and slaughterhouse variation.

The most important risk factors for high DOA-% were: ambient temperature ($<0^{\circ}\text{C}$ and >15 or $>20^{\circ}\text{C}$ depending on flock type), distance from farm to slaughterhouse, destined slaughterhouse and space allowance ($\leq 160 \text{ cm}^2/\text{kg}$). Longer distances from farm to slaughterhouse were associated with increased probability of high DOA-% at temperatures below 15°C , whereas shorter distances were associated with high DOA-% in warmer weather ($>15^{\circ}\text{C}$) in thinning flocks and not thinned flocks.

Other less prominent risk factors were: longer lairage time, higher mean wind speed and time of arrival to the slaughterhouse. The effects of wind speed and arrival time were only found in not thinned flocks. Farm-related factors associated with high DOA-% in some flock types were: younger parent flocks, higher average daily weight gain, ratio between % birds found dead and culled above 1.25, revaccination against infectious bronchitis, higher % broilers condemned for disease-related reasons, higher % runts and above 0.05 % dead broilers before catching.

Overall, the results suggest that characteristics related to the event of transport to a higher extent than the rearing period impact the risk of high DOA-%. The farm level variance in previously thinned and not thinned flocks indicates that herd level management factors other than those available in KIK may be important.

The prediction models contained ambient temperature, distance from farm to slaughterhouse, wind speed, time of arrival and average DOA-% for the previous three flocks transported from the same house, but with different weighting in the models. The models resulted in many misclassifications when calculating the predicted probability for high DOA-% in 2014 based on data from 2011-2013. Due to the uncertainties, the predicted probabilities should be interpreted and used with caution. It is concluded that a risk assessment system based on the four models will result in correct classification of few high risk flocks and many concurrent misclassifications.

Baggrund

Dødelighed hos slagtekyllinger i forbindelse med transport til slagteriet, kaldet 'dead-on-arrival' (DOA), er defineret som en velfærdsindikator i Slagtekyllingedirektivet (EF/43/2007). Direktivet foreskriver, at de kompetente myndigheder fører kontrol med forekomsten på flokniveau. På danske fjerkræslagterier tæller virksomheden døde kyllinger i forbindelse med ophængning, hvor der foretages en vurdering af, om kyllingen var død før eller efter indfangningens start. DOA er således udtryk for en dødelighed, der kan være relateret til både indfangning, transport og venteperiode på slagteriet før aflivning. Derfor er DOA ikke kun relateret til kyllingernes egnethed til transport, men også en direkte indikator for reduceret velfærd som følge af transportens faser. Danske konventionelle slagtekyllingeflokke indfanges typisk maskinelt og læsses i transportkasser, som er en del af et integreret modulsystem. Lastbilerne, der fragter modulerne fra besætningen til slagteriet, er passivt ventilerede, og i vinterhalvåret påsættes presenninger. Ved ankomst til slagteriet placeres modulerne i et venteområde indtil ophængning. Udstyr og procedurer omkring indfangning, transport og venteperioden på slagteriet varierer mellem slagterierne.

En række studier har undersøgt forekomsten af DOA siden 1990'erne i forskellige dele af verden, senest er gennemsnitligt 0,13-0,15 % rapporteret i Storbritannien i 2011-2013 (Part et al., 2016) og 0,37 % i Tjekkiet i 2009-2014 (Vecerek et al., 2016). De hyppigste risikofaktorer for DOA undersøgt i tidligere studier inkluderer: vejrforhold (Bayliss et al., 1990; Nijdam et al., 2004; Warriss et al., 2005; Vecerek et al., 2006; Whiting et al., 2007; Haslam et al., 2008; Knezacek et al., 2010; Chauvin et al., 2011; Vieira et al., 2011; Part et al., 2016), indfangningsmetode (Chauvin et al., 2011), transporttid og afstand (Nijdam et al., 2004; Vecerek et al., 2006; Vieira et al., 2010), ventetid og forhold på slagteriet (Nijdam et al., 2004; Warriss et al., 2005; Vieira et al., 2010), lastetæthed (Nijdam et al., 2004; Whiting et al., 2007; Chauvin et al., 2011), slagtevægt (Nijdam et al., 2004; Haslam et al., 2008) og dødelighed i besætningen (Drain et al., 2007; Haslam et al., 2008; Jacobs et al., 2016a). Ovenstående risikofaktorer kan i de fleste tilfælde relateres til et misforhold mellem kyllingernes evne til at termoregulere og de klimatiske forhold i transportkasserne, enten direkte (f.eks. vejrforhold, transporttid, ventetid, lastetæthed) eller indirekte, da svækkede kyllinger (f.eks. med skader eller sygdom) angiveligt er mindre modstandsdygtige overfor temperaturstress (Mitchell et al., 2004). Studier har indikeret en sammenhæng mellem højere genetisk vækstpotentiale, forøget varmeproduktion og nedsat evne til at termoregulere (Deeb et al., 2002; Yahav et al., 2005). I lyset af dette og forventede klimaforandringer, hvor vejret i Danmark kan risikere at blive mere ekstremt, er det særlig relevant at undersøge effekten af vejrforhold på DOA. Endelig har

stress i forbindelse med transport også konsekvenser for kødkvalitet (Dadgar et al., 2010; Petracci et al., 2010) og fødevarer sikkerhed (Whyte et al., 2001), samtidig med at langvarige transporter medfører lavere slagtevægt (Warriss et al., 1999; Jacobs et al., 2016b), øjensynlig som følge af dehydrering og langvarig faste.

Kun få undersøgelser har studeret en række risikofaktorer for DOA parallelt (Bayliss et al., 1990; Nijdam et al., 2004; Chauvin et al., 2011), mens langt de fleste har undersøgt isolerede effekter af enkeltfaktorer. Delprojekt 1 er således det første observationelle studie, der afdækker forekomsten af, og risikofaktorer for, DOA i Danmark. Ved at benytte registerdata, har det været muligt at undersøge en lang række faktorer samtidigt på et meget stort datamateriale for på den måde at afdække, hvordan DOA potentielt kan reduceres og måske forudsiges. Hvis man kan forudsige en høj DOA-forekomst før selve transporten, vil man kunne fokusere indsatsen overfor DOA på de mest udsatte transporter.

Formål

Formålene med delprojektet er:

1. at identificere risikofaktorer for høj DOA-forekomst på flokniveau hos konventionelle slagtekyllingeflokke transporteret til danske slagterier.
2. at undersøge om registerdata kan bruges til at forudsige høj DOA-forekomst forud for indtransport.

Materialer og metoder

Projektets forløb

Ved projektets start var formålet at indsamle data i slagtekyllingebesætninger såvel før som efter transport til slagteri for at kunne sammenligne kyllingernes tilstand og dermed vurdere dyrenes transportegnethed.

Forundersøgelser af forekomst og fordeling af DOA i registerdata fra danske slagtekyllingeflokke indikerede dog, at variationen i DOA mellem flokke er lav. For at øge muligheden for at kunne påvise væsentlige sammenhænge mellem DOA-forekomst og mulige risikofaktorer på flokniveau blev det på Styregruppemødet i 2015 (2014-14-79-00022) besluttet at øge stikprøvestørrelsen ved at bruge data fra Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen (KIK)-databasen i stedet for de oprindeligt planlagte besætningsbesøg. Herved blev det muligt at indsamle repræsentative data på næsten hele populationen af slagtekyllingeflokke slagtet i Danmark. Formålet blev ved samme lejlighed omformuleret til at fokusere på årsagerne til høj DOA-forekomst for herved at kunne målrette en evt. udpegning af flokke eller situationer med risiko for høj dødelighed under transporten.

På baggrund af en litteratursøgning og besøg på de to største danske fjerkræslagterier i marts 2015 (det tredje lukkede i marts 2015), blev der produceret en bruttoliste af parametre registreret på flokniveau.

Efter aftale med KIK's Styregruppe blev et datasæt fra KIK-databasen bestilt i juni 2015. Datasættet er omfattet af en fortrolighedsaftale. Det første datasæt blev modtaget i september 2015, efterfulgt af en længere periode med opklaring af uklarheder i data og bestilling af nødvendigt supplerende datamateriale. Det endelige datasæt blev modtaget i december 2015 (Bilag 1). Sideløbende hermed blev

et datasæt fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) bestilt og modtaget i november 2015. Alle data blev tjekket for fejl og mangler, editert og analyseret som beskrevet nedenfor i perioden mellem november 2015 og oktober 2016.

Foreløbige resultater fra delprojektet er blevet præsenteret ved årsmødet i Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine (SVEPM) i Helsingør d. 16.-18. marts 2016 (poster, <http://www.svepm.org.uk/posters.html>), ved Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) konferencen i York, England d. 23. juni 2016 (mundtligt oplæg, <http://www.ufaw.org.uk/downloads/york-2016---programme-and-abstracts-23-june.pdf>) samt for projektgruppen i Fødevarestyrelsen d. 10. maj 2016. Resultaterne er blevet præsenteret for slagterierne ved separate møder med de to virksomheder i efteråret 2016, for derved at diskutere fortolkningen af resultaterne i relation til de faktiske forhold og procedurer på slagterierne, samt for at vurdere muligheden for implementering af et vejledende risikovurderingssystem og evt. forbedring af registreringerne.

Studiedesign og -population

Studiet var et retrospektivt observationelt studium baseret på registerdata fra alle konventionelle slagtekyllingeflokke leveret til de tre største danske fjerkræslagterier i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014. Studieneheden var således en slagtekyllingeflok, og hver observation i datasættet repræsenterede én slagtekyllingeflok defineret som kyllinger, indsat og opdrættet i samme hus, på samme CHR nummer, som blev transporteret til slagtning på samme dato. De tre største fjerkræslagterier i Danmark (benævnt Slagteri A, B og C) blev inkluderet for at opnå så komplet et datasæt som muligt.

Målpopulation

Studiet er relevant for konventionelt opdrættede slagtekyllingeflokke af samme hybrid (Ross¹), transporteret under tilsvarende klimatiske forhold, med brug af tilsvarende udstyr til og procedurer omkring indfangning og transport, som i Danmark i studieperioden.

Dataeditering

Data fra KIK

Et datasæt med 17.745 flokke (402.676.753 slagtekyllinger) slagtet på et af de tre inkluderede slagterier blev modtaget fra KIK, svarende til 96,5 % af alle kyllinger slagtet i Danmark i 2011-2014 (Danmarks Statistik, 2016). Datasættet indeholdt data registreret af hhv. rugerier, producenter, fangerhold, transportører, slagteripersonale og veterinærkontrol med i alt 69 variable omhandlende forældredyrsflokke, produktionsdata, indfangning, læsning, transport samt ventetid på slagteriet. Beskrivelse af alle variable blev indhentet fra Lyngsøe Systems A/S og, hvor uddybning var nødvendig, fra slagterierne.

Alle flokke fra to CHR numre på Bornholm blev fjernet fra datasættet (n=92) pga. disse besætningers ophør i studieperioden samt den markant længere afstand til slagteriet. Tolv CHR numre skiftede ejer i studieperioden. For at alle CHR numre i datasættet udelukkende repræsenterede et ejerskab, blev 146 observationer slettet, hvorved ejerskabet med flest observationer blev bibeholdt. Datasættet blev undersøgt for dubletter (27 observationer), ulogiske/urealistiske værdier (f.eks. slagtealder > 49 dage), og manglende data (f.eks. DOA-%), hvilket reducerede datasættet til 17.375 flokke.

¹ Primært Ross 308, 4 % Ross 708 i perioden.

Konstruktion af nye variable ved kategorisering og beregninger

DOA-% blev kategoriseret i en høj og lav kategori, da formålet var at udpege flokke med risiko for høj DOA-%. Grænseværdien blev sat til de 15 % højeste forekomster (DOA-% > 0,342 %), valgt ud fra fordelingen af data. Alle kontinuerte variable blev undersøgt for normalfordeling og ekstreme værdier. Ekstreme værdier blev fjernet, når de blev anset for meget usandsynlige. Nye forklarende variable blev beregnet ud fra de modtagne variable fra KIK (Bilag 1), og tjekket for normalfordeling og ekstreme værdier samt sammenhæng med andelen af høj DOA-% for at undersøge, om forudsætningerne for den statistiske analyse var opfyldt, eller variablen f.eks. burde kategoriseres. Grænseværdier for kategorisering blev valgt ud fra biologisk logik henholdsvis visuel inspektion af plots. For oversigt og definitioner af analyserede variable se Bilag 2.

Datakvalitet

Inspektion af fordelingen af de kontinuerte forklarende variable, i hele datasættet og indenfor slagterier, indikerede en række fejl og mangler, som resulterede i, at dataværdier måtte slettes før analyse. De mest markante fejl og mangler, samt måden de blev håndteret på, er opgjort i Bilag 3-6, og kan kort beskrives:

1. De beregnede tidsintervaller var i 2.677 (15,4 %) tilfælde fejlbehæftede (Bilag 3). Afstanden mellem besætning og slagteri blev derfor brugt som udtryk for transporttiden i analyserne. Ventetiden på slagteriet blev benyttet, hvis der ikke var konstateret fejl i det registrerede slagtetidspunkt.
2. Der var stor forskel i registreringen af kassationsårsager mellem de tre slagterier (Bilag 4), formentlig pga. manglende ensartethed i veterinærkontrollens brug af diagnosekategorier. Kassationsårsagerne måtte således grupperes i analyserne.
3. Inspektion af plots af fordelingen af slagteriernes observationer af hasesvidninger og vingeskader på slagtelinjen viste store forskelle mellem slagterierne (Bilag 5). Årsagen kunne ikke findes, så disse to variable blev ikke inkluderet i de multivariable analyser.
4. Antallet af fangerhold og fangemaskiner registreret i KIK stemte ikke overens med det oplyste på et af slagterierne. Diskrepansen kunne ikke opklares ved kontakt med slagterierne. Som følge af dette blev fangerhold og -maskiner ikke inkluderet i de multivariable analyser.
5. Der var i 17.030 (98,0 %) af observationerne varierende grad af forskel mellem % dødelighed beregnet af slagteriet og % dødelighed registreret af producenten (Bilag 6). Ifølge Lyngsøe Systems er det en hyppigt forekommende fejl, som de ikke kan forklare. Den producent-registrerede dødelighed blev brugt som udtryk for dødelighed i de videre analyser for at kunne analysere separat på % aflivede og % selvdøde kyllinger. Differencen mellem % beregnet og % registreret dødelighed blev endvidere testet som forklarende variabel for høj DOA-%.

Data fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Datasættet fra DMI dækkede perioden 1. januar 2011 t.o.m. 31. december 2014 og indeholdt to observationer per dato, for tidsrummene kl. 06.00-18.00 og kl. 18.00-06.00. Data stammede fra vejrstationen Aars Syd, som er geografisk mest centralt placeret i forhold til de tre slagterier. Datasættet indeholdt målinger af middeltemperatur (°C), maksimumtemperatur (°C), minimumtemperatur (°C), middel relativ luftfugtighed (%), middelvindhastighed (m/s), middelglobalstråling (W/m²) og akkumuleret nedbør (mm). Hver værdi repræsenterede gennemsnittet af en måling hvert 10. minut i 12-timersintervallerne. Der blev ikke konstateret logiske fejl og ekstreme

værdier i datasættet. Datasættet blev sat sammen med datasættet fra KIK ud fra dato og tidspunkt for ankomst af 1. læs til slagteriet.

Dataanalyse

For at kunne modellere den hierarkiske datastruktur, blev 130 CHR-hus kombinationer (2.860 observationer) med ufuldstændige observationer (mindst et helt kalenderår manglede) fjernet. Nogle mangelfulde observationer kunne forklares ved ejerskifte, mens andre forblev uopklarede. Dermed indgik 14.515 flokke fra 356 CHR-hus kombinationer fra 155 CHR numre i datasættet til yderligere analyser (dvs. i alt 18 % af observationerne i det oprindelige datasæt var blevet fjernet pga. fejl og mangler før analyse).

Forudsætninger

Datasættet blev forsøgt analyseret samlet, men overlap/korrelationer mellem slagtegruppe (delslagtede, tidligere delslagtede eller ikke-delslagtede flokke), slagteri, afstand til slagteri og slagtealder bevirkede, at datasættet måtte opdeles for at få meningsfulde analyser, der kunne fortolkes.

Datasættet blev opdelt på to måder jf. delprojektets to formål:

1. Risikofaktorstudiet inkluderede data fra Slagteri A², B og C. Datasættet blev opdelt i tre undergrupper baseret på slagtegruppe. Observationer fra Slagteri A i to af undergrupperne blev udeladt pga. meget få observationer (n=180 tidligere delslagtede flokke, n=179 delslagtede flokke). En delmængde af datasættet (ikke-delslagtede flokke transporteret til Slagteri A³) blev analyseret separat for at undersøge effekten af lastetæthed på risikoen for høj DOA-forekomst.
2. Prædiktionsstudiet inkluderede data fra de to eksisterende slagterier (A² og B). Datasættet blev opdelt i seks undergrupper baseret på slagteri og slagtegruppe. Da to af undergrupperne, som nævnt ovenfor, indeholdt for få observationer til den statistiske analyse, blev fire datasæt brugt til analyse.

For i prædiktionsstudiet at kunne undersøge, om en producents tidligere data kan prædiktere de fremtidige, blev der for en række variable dannet forskudte variable på Hus-indenfor-CHR-niveau (Bilag 2).

Deskriptive analyser viste, at en underpopulation af ikke-delslagtede flokke transporteret til Slagteri B fra fem CHR-numre havde markant højere DOA-% end resten af flokkene i samme undergruppe og en markant anderledes observeret sammenhæng med flere forklarende variable, f.eks. afstanden til slagteriet, selvdøde/aflivede kyllinger og vaccinationer. For at undgå, at modellens resultater blev forvrængede af denne underpopulation, blev observationerne (n=217) udeladt af datasættet til prædiktionsmodellen.

Statistisk modellering

De i alt otte datasæt blev analyseret med state-of-the-art generaliserede hierarkiske regressionsmodeller, som tager højde for datastrukturen. Den statistiske modellering er beskrevet detaljeret i Bilag 7.

² Slagteri A foretog i oktober/november 2012 gennemgribende ændringer af deres produktionsapparat, hvilket påvirkede såvel lastbiler, modulsystem og venteområdet på slagteriet. Af den grund blev kun data efter denne periode benyttet til de videre analyser.

³ Data var kun tilgængeligt fra Slagteri A.

Resultater

Forekomst og fordeling af DOA-% i Danmark i 2011-2014

Den gennemsnitlige registrerede DOA-% per flok på tværs af de tre slagterier A, B og C i 2011-2014 var 0,27 % (median: 0,21 %), fx svarende til 81 kyllinger døde under transport i en leverance på 30.000. Der var en markant årstidsvariation og variation mellem slagterier og slagtegrupper.


Risikofaktorer for høj DOA-%

Tabel 1-3 i Bilag 8 viser resultaterne af de tre slagtegruppespecifikke risikofaktormodeller, hvor risikofaktorerne er grupperet efter om de vedrører flokkens sundhedstilstand forud for transporten (besætningsrelaterede faktorer), forhold under selve transporten (transportrelaterede faktorer) eller slagteriet (slagteri-relaterede faktorer). Generelt går de vigtigste risikofaktorer igen uanset slagtegruppe, men faktorerne har forskellig vægtning og enkelte faktorer er kun statistisk signifikante i en af de slagtegruppespecifikke modeller. De mest konsistente væsentlige risikofaktorer for høj DOA-% var:

- Omgivelsernes gennemsnitlige temperatur (højest DOA-% ved temperaturer under 0°C samt over 15°C eller 20°C afhængigt af slagtegruppe),
- Længere afstand fra besætningen til slagteriet medførte generelt højere DOA-%,
- Højere lastetæthed end foreskrevet af Transportforordningen (EU1/2005) ($\leq 160 \text{ cm}^2/\text{kg}$)⁴,
- Hvilket slagteri flokken blev transporteret til (A, B eller C).


Der var en forstærket effekt af længere afstand i koldt vejr (< 0°C) sammenlignet med 0-15°C (Bilag 8, Tabel 1-3), men mest udtalt i delslagtede (Bilag 8, Tabel 2) og ikke-delslagtede flokke (Bilag 8, Tabel 1), hvor kortere afstand omvendt var forbundet med høj DOA-% i varmere vejr (>15°C). Figur 1 viser, at der var væsentlig højere sandsynlighed for høj DOA-%, når det var over 20°C for flokke transporteret fra besætninger, der lå op til ca. 140 km fra Slagteri B sammenlignet med, hvis det var 15-20°C. Samtidig var der højere sandsynlighed for høj DOA-%, når det var 15-20°C for flokke transporteret fra besætninger, der lå op til ca. 40 km fra Slagteri B sammenlignet med, hvis det var 0-15°C. Det er usikkert, om kortere afstand i varmt vejr i lige så høj grad er en risikofaktor for flokke transporteret til Slagteri A som B, fordi der var færre observationer med korte afstande til Slagteri A. Omvendt var sandsynligheden for høj DOA-% markant forøget ved afstande længere end ca. 40 km til Slagteri B ved temperatur under 0°C sammenlignet med 0-15°C.

⁴ Kun data fra Slagteri A.



Figur 1. Sammenhæng mellem model-prædikeret sandsynlighed for høj DOA-% ved fem temperaturintervaller og afstand fra besætning til slagteri for ikke-delslagtede kyllingeflokke transporteret til Slagteri B i perioden 2011-2014. Punkter med lodrette linjer angiver gennemsnitlige sandsynligheder med 95 % konfidensinterval for afstanden i km. Middelvindhastighed, forældreflokkens alder, % kasserede kyllinger af sygdomsmæssige årsager, % undermålerkyllinger og gennemsnitlig daglig tilvækst er sat til gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 00.00-06.00 og % døde kyllinger før indfangning til lavt niveau ($\leq 0,05$ %).


Højere lastetæthed (≤ 160 cm²/kg) end foreskrevet i Transportforordningen (EU 1/2005) var forbundet med høj DOA-% sammenlignet med lavere lastetæthed ved transport i 0-15°C (kun undersøgt for ikke-delslagtede flokke transporteret til Slagteri A) (Bilag 8, Tabel 4). Der var ikke forskel i risikoen for høj DOA-% ved højere eller lavere lastetæthed når omgivelsernes temperatur var under 0°C. Der var ikke observationer nok til at vurdere effekten i varmt vejr ($> 15^\circ\text{C}$) (Figur 2). Der var forskel på risikoen for høj DOA-% mellem slagterierne for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede flokke (Bilag 8, Tabel 1,3). Andre mindre væsentlige risikofaktorer inkluderede: højere middelvindhastighed og ankomst til slagteriet om aftenen for ikke-delslagtede flokke (Bilag 8, Tabel 1) og ventetid på slagteriet for alle flokke (Figur 3).



Figur 2. Sammenhæng mellem model-prædikeret sandsynlighed for høj DOA-% ved hhv. gennemsnitlige temperaturer på <0°C, 0-15°C, 15-20°C og >20°C og højere ($\leq 160 \text{ cm}^2/\text{kg}$) og lavere ($> 160 \text{ cm}^2/\text{kg}$) lastetæthed end Transportforordningen (EU 1/2005) foreskriver for ikke-delslagtede slagtekyllingeflokke transporteret til Slagteri A i perioden 2013-2014⁵. For omgivende temperaturer <0°C var der ingen forskel på sandsynligheden for høj DOA-% ved højere og lavere lastetæthed, hvorfor kategorierne er slået sammen. Der var ikke tilstrækkeligt mange observationer med høj lastetæthed ved >15°C til at kunne vurdere effekten, hvorfor kategorierne er slået sammen. Punkter med lodrette linjer angiver sandsynligheder med 95 % konfidensinterval. Middelvindhastighed, % kasserede kyllinger af sygdomsmæssige årsager, ventetiden på slagteriet og afstanden fra besætningen til slagteriet er sat til gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 00.00-06.00 og slagtealder til ≤ 37 dage.


En række besætningsrelaterede faktorer var forbundet med moderat øget sandsynlighed for høj DOA-% i risikofaktormodellerne, også set i forhold til det observerede spænd af værdier (Bilag 8, Tabel 1-3). Procent døde kyllinger før indfangning (DOD-%) ($> 0,05 \%$) var stærkt associeret med høj DOA-% i alle modellerne, men det kan ikke udelukkes, at årsagen hertil er overlap i optællingsmetoden. Modellerne blev derfor gentestet uden DOD-%. Det viste sig, at variabelen ikke konfunderede de andre effekter i modellen, og derfor godt kunne fjernes fra modellen, og at det derfor heller ikke er klart, om den er en 'ægte risikofaktor'.

⁵ Data fra 2011-2012 kunne ikke inkluderes, da det ikke var muligt at opklare dimensioner og antal kasser per modul på Slagteri A i perioden.



Figur 3. Sammenhæng mellem model-prædikeret sandsynlighed for høj DOA-% på Slagteri A, B og C og ventetiden på slagteriet (min) for ikke-delslagtede kyllingeflokke transporteret ved omgivende temperaturer på 0-15°C i perioden 2011-2014. Punkter med lodrette linjer angiver sandsynligheder med 95 % konfidensinterval. Middelvindhastighed, forældreflokkens alder, % kyllinger kasseret af sygdomsmæssige årsager, % undermålerkyllinger og gennemsnitlig daglig tilvækst er sat til gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 00.00-06.00 og % døde kyllinger før indfangning til lavt niveau ($\leq 0,05$ %).

Andelen af kyllinger som var blevet kasseret af sygdomsmæssige årsager var forbundet med høj DOA-% i alle tre modeller. Lav ratio mellem % selvdøde og % aflivede kyllinger ($\leq 1,25$) havde beskyttende effekt mod høj DOA-% i tidligere delslagtede flokke (Bilag 8, Tabel 3), som illustreret i Figur 4 i sammenhæng med afstand fra besætningen til slagteriet. Andre besætningsrelaterede risikofaktorer med mindre betydende effekt var: højere gennemsnitlig daglig tilvækst, højere % undermålerkyllinger, revaccination mod infektiøs bronkitis i opdrætsperioden samt yngre forældreflok (Bilag 8, Tabel 1-3). Variationen i sandsynligheden for høj DOA-% var størst mellem besætninger, undtagen for delslagtingerne, hvor variationen i højere grad var på husniveau indenfor besætningerne (Bilag 8, Tabel 1-3).



Figur 4. Sammenhæng mellem model-prædikeret sandsynlighed for høj DOA-% ved høj eller lav ratio mellem % selvdøde og % aflivede kyllinger på Slagteri B og den korteste afstand fra besætning til slagteri for tidligere delslagtede kyllingeflokke transporteret ved omgivende temperaturer på 0-15°C i perioden 2011-2014. Punkter med lodrette linjer angiver sandsynligheder med 95 % konfidensinterval. Ventetiden på slagteriet, % kyllinger kasseret af sygdomsmæssige årsager og gennemsnitlig daglig tilvækst er sat til gennemsnittet, mens % kyllinger døde før indfangning er sat til lavt niveau ($\leq 0,05$ %).


Prædiktionsmodeller – kan registerdata bruges til forudsigelse af høj DOA-%?

Resultaterne af de fire prædiktionsmodeller er illustreret i Bilag 9, Tabel 1. Risikofaktorerne, der alle kan måles eller estimeres forud for transporten, har samme fortegn, men forskellig vægtning mellem slagterier og slagtegrupper. De vigtigste faktorer svarer til risikofaktormodellernes, men med tilføjelse af gennemsnittet af de seneste tre leverancers DOA-%, som var meget markant forbundet med øget sandsynlighed for høj DOA-% i tidligere delslagtede flokke på Slagteri B. Figur 1-3 i Bilag 9 illustrerer usikkerheden på parameterestimaterne i prædiktionsmodellerne og bredden på 'skyerne' omkring de prædikterede sandsynligheder afspejler antallet af kombinationer af afstande og temperaturintervaller i datasættet. Ved meget korte og lange afstande er usikkerheden derfor størst.

For at få en idé om, hvor sikkert prædiktionsmodellerne kan klassificere flokkene korrekt som hhv. høj og lav DOA-% før transporten, kan man se på Figur 5, der viser risikoen for fejlklassifikationer i 2014 baseret på parameterestimaterne udledt af data fra 2011-2013 for de fire prædiktionsmodeller. Den gennemsnitlige andel af fejlklassifikationer er overordnet set lavere blandt de ikke-delslagtede flokke leveret til Slagteri A (i bedste fald er ca. 10 % af klassifikationer forkerte) sammenlignet med Slagteri B, uanset slagtegruppe, mens fejlklassifikationen er højest for de delslagtede flokke leveret til Slagteri B (i bedste fald ca. 20 %). Fælles for de fire modeller er dog, at for at opnå den lavest mulige samlede fejlklassifikation vil størstedelen være falsk-negative flokke, altså meget få højrisikoflokke bliver

udpeget. Eksempelvis vil modellen for Slagteri A's ikke-delslagtede flokke give i alt 105 fejlklassificerede flokke ved en grænseværdi på 25 % prædikeret sandsynlighed for høj DOA-% ($Se=0,120$ og $Sp=0,997$). Af de 105 flokke vil tre være falsk-positive ud af i alt 17 udpegede højrisiko-flokke i 2014. Man får dog ved den grænseværdi kun udpeget 12 % af de flokke, der viste sig at have høj DOA-% i 2014. Flytter man grænseværdien ned for at forbedre sensitiviteten, og derved øge andelen af udpegede høj-DOA-% flokke, får man samtidig udpeget mange flere falsk-positive (se Bilag 10 for eksempel på beregning). Modellen for Slagteri B's delslagtede flokke vil til sammenligning give i alt 80 fejlklassificerede flokke ved grænseværdi 33 % prædikeret sandsynlighed for høj DOA-% ($Se=0,074$ og $Sp=0,992$). Af de 80 flokke vil to være falsk-positive ud af i alt 8 udpegede højrisiko-flokke i 2014, svarende til udpegning af 7 % af de flokke, der viste sig at have høj DOA-% i 2014.

Alt i alt viste det sig således ikke muligt at pege på en metode, der baseret på de data, der var til rådighed, kunne give en sikker udpegning af flokke med høj sandsynlighed for høj DOA-% uden samtidig fejlagtigt at udpege mange flokke som højrisiko på trods af, de faktisk endte med at have lav DOA-%.



Figur 5. Plot af den totale fejlklassifikationsprocent (andel fejlklassificerede flokke ud af det totale antal flokke transporteret) ved grænseværdier for prædikeret sandsynlighed for høj DOA-% mellem 0 og 100 % for fire slagteri- og slagtegruppespecifikke prædiktionsmodeller. Prædiktion af sandsynligheden for høj DOA-% i 2014 på baggrund af modeller baseret på data fra 2011-2013². n angiver antal observationer i 2014.

Diskussion

Undersøgelsens begrænsninger

Undersøgelsens styrke er tilgængeligheden af store mængder data. En begrænsning ved undersøgelsen var imidlertid det forholdsvis store datatab (18 %) fra det rå til det anvendte datasæt. Dette giver en vis usikkerhed i konklusionerne. Fejlprocenten i data kan have haft betydning for, hvor tilsyneladende lille betydning nogle af de besætningsrelaterede faktorer havde i risikofaktormodellerne. Data kom fra mange forskellige kilder og blev ofte registreret manuelt, hvorfor en vis fejlprocent må forventes, men i flere tilfælde var der tale om systematiske fejl og mangelfulde registreringer. Omvendt bestyrkes modelresultaterne af parameterestimaternes robusthed og valget af et konservativt signifikansniveau på $P=0,01$ og underbygges, som beskrevet nedenfor, af studier fra udlandet.

Risikofaktorer for høj DOA-% i Danmark

Forekomsten af DOA i dette studie (0,27 %) er sammenlignelig med forekomsten rapporteret i fire undersøgelser fra samme periode, hhv. 0,37 % i 2009-2014 i Tjekkiet (Vecerek et al., 2016), 0,30 % i 2013-2014 i Belgien (Jacobs et al., 2016a), men højere end de 0,13-0,15 % fundet i 2011-2013 i Storbritannien (Part et al., 2016) og 0,09 % i 2012-2013 i Norge (Kittelsen et al., 2015). Variationen i DOA-forekomsten mellem undersøgelser kan skyldes forskelle i målemetoder og stikprøvestørrelser, men også være udtryk for forskelle i risikoen for DOA mellem lande.

Resultaterne af denne undersøgelse peger på, at karakteristika ved transporten (f.eks. vejforhold, afstand og slagteri) i højere grad end ved besætningen (f.eks. kyllingernes sundhedstilstand før transporten) har betydning for, om en flok får registreret en høj DOA-%. Denne vægtning af risikofaktorerne stemmer overens med tidligere studier af dødsårsager hos DOA-kyllinger, hvor hovedparten viste tegn på lungeødem (angiveligt som følge af varme- eller kuldestress) og traumatiske skader, mens sygdomsmæssige tilstande relateret til forhold i besætningen (f.eks. undermålerkyllinger med uræmi og/eller bugvattersot) var årsag til en mindre del af DOA-tilfældene (Lund et al., 2013; Kittelsen et al., 2015). Kun få andre observationelle studier har, som denne undersøgelse, inkluderet et bredt udsnit af potentielle risikofaktorer for DOA, og i de fleste tilfælde på et langt mindre datamateriale. Fordelen ved nærværende studie er derfor, at vi ved at undersøge flere risikofaktorer parallelt får viden om, hvor vigtige faktorerne er i forhold til hinanden og derfor kan pege på tiltag, der potentielt kan reducere DOA. De mange stærkt signifikante risikofaktorer indikerer således, at DOA er et multifaktorielt problem, og at forskellige tiltag vil være nødvendige for at reducere forekomsten heraf.

Transport-relaterede faktorer

En række studier har, som dette studie, indikeret en sammenhæng mellem omgivelsernes temperatur og forekomsten af DOA, under klimatiske forhold, der minder om Danmark, såsom i Storbritannien (Warriss et al., 2005), Holland (Nijdam et al., 2004) og Tjekkiet (Vecerek et al., 2006). Varmestress som følge af misforhold mellem høj udetemperatur, utilstrækkelig ventilation og kyllingernes evne til at termoregulere er velbeskrevet som en af de vigtigste årsager til høj DOA forekomst (Mitchell et al., 2004). En ny undersøgelse fra Storbritannien indikerer, at risikoen for DOA stiger, når den gennemsnitlige maksimale døgntemperatur er under 8°C eller over 19°C (Part et al., 2016), mens en tidligere undersøgelse viste, at risikoen for DOA stiger fra 17°C (Warriss et al., 2005). I vores undersøgelse var der en øget risiko for høj DOA allerede fra en gennemsnitlig temperatur på 15°C under transport i nogle slagtegrupper, hvilket kan skyldes, at vi brugte gennemsnitlig temperatur over 12 timer, mens ovennævnte studier brugte maksimal døgntemperatur. Visuel inspektion af deskriptive

plots af den gennemsnitlige udendørstemperatur og andelen af flokke med høj DOA-% viste da også en u-formet kurve, hvor andelen af flokke med høj DOA-% steg fra ca. 17°C, var stabil ned til omkring frysepunktet, og igen steg ved temperaturer under 0°C (Bilag 11). Tegn på kuldestress er rapporteret ved transport i ekstrem kulde (Knezacek et al., 2010; Strawford et al., 2011; Burlingquette et al., 2012), hvor der blev målt store temperaturforskelle mellem omgivelserne og transportkasserne (17,7°C til 55,2°C højere i kasserne) (Knezacek et al., 2010). Det er derfor muligt at såvel varme- som kuldestress kan forekomme på samme tid i forskellige moduler på passivt ventilerede lastbiler med presenninger i vinterhalvåret, også i tempereret klima (Hunter et al., 1997; Mitchell et al., 1998; Kettlewell et al., 2000), og således også i Danmark, hvor presenningerne typisk påsættes ved udendørs temperaturer under 10-12°C.

Tidligere studier har som vores indikeret, at længere transporttid (Warriss et al., 1992; Nijdam et al., 2004; Petracci et al., 2005) eller afstand fra besætning til slagteri (Vecerek et al., 2006) er forbundet med højere DOA-%. Andre forfattere har vist, at kyllingerne er mere udsatte for varmestress under indfangning og i venteområdet på slagteriet end under selve transporten (Ritz et al., 2005), hvilket dog forudsætter, at lastbilen er i bevægelse, da risikoen for varmestress hurtigt stiger i et holdende køretøj (Mitchell et al., 1998). Derfor formodes korte transporter i varmt vejr, hvor kyllingerne i forvejen er prædisponerede for varmestress i forbindelse med indfangning, at medføre øget risiko for høj DOA-%, hvorimod længere transporter her potentielt kan nå at nedkøle kyllingerne før ankomsten til slagteriet (som indikeret i vores studie for ikke-delslagtede og delslagtede flokke og i enkelte tidligere studier (Nijdam et al., 2004; Ritz et al., 2005; Vieira et al., 2010)). Årsagen til, at der ikke var en lignende effekt i de tidligere delslagtede flokke kan ikke afdækkes.

Transportforordningen (EU 1/2005; Bilag 1, Kapitel VII, E) indeholder mindstekrav til lastetæthed for kyllinger (1,6-3 kg) på 160 cm²/kg, som dog skal tilpasses dyrenes fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed. Vi valgte grænseværdien på 160 cm²/kg efter visuel inspektion af deskriptive plots, som viste, at andelen af flokke med høj DOA-% var stigende ved højere lastetætheder (<160 cm²/kg). Lastetæthed har været rapporteret som risikofaktor for DOA i flere tidligere studier (Nijdam et al., 2004; Whiting et al., 2007; Chauvin et al., 2011), mens andre forfattere ingen effekt fandt, måske pga. de valgte grænseværdier (Petracci et al., 2005). Baggrunden for den forøgede risiko for DOA ved høj lastetæthed kan være varmestress sfa. utilstrækkelig ventilation, måske influeret af transportkassernes indvendige højde (Taylor et al., 2001). Et eksperimentelt studie har indikeret, at kyllinger producerer mere varme og fugt, jo lavere omgivende temperatur (-15°C til 20°C) og forsøget tydede på, at forskellen stiger med højere lastetæthed (Watts et al., 2011). Vi kunne ikke påvise en forskel i risikoen for høj DOA mellem flokke transporteret ved høj eller lav lastetæthed i koldt vejr (< 0°C), men det var overordnet set værre at blive transporteret i koldt vejr uanset lastetæthed end ved 0-15°C ved den foreskrevne lastetæthed.

Ankomst til slagteriet i aftentimerne fremfor om natten var forbundet med høj DOA-%, hvilket betyder, at flokke indfanget og transporteret om eftermiddagen har højere risiko. Mulige forklaringer herpå kan være: forskelle mellem fangerhold, da de opererer i bestemte geografiske områder (Nijdam et al., 2004) eller at indfangning i dagslys giver mere klumpning i huset (Ritz et al., 2005).

Slagteri-relaterede faktorer

Andre studier har også observeret en forskel mellem slagterier mht. DOA-% (Drain et al., 2007; Jacobs et al., 2016a). Årsagerne til forskellen mellem slagterierne i dette studie kan skyldes en række forhold og

være udtryk for, at relevante risikofaktorer ikke var tilgængelige i KIK-databasen, f.eks. brug af vinter-presenninger på lastbilerne. Det kan heller ikke udelukkes, at forskelle i måden DOA-% og DOD-% registreres på, kan være en del af forklaringen. Herudover kan forskelle i design og vedligeholdelsesgrad af lastbiler, modulsystemer og transportkasser sandsynligvis have betydning (Mitchell et al., 1998; Jacobs et al., 2016b). Vi kender ikke til studier, der direkte sammenligner forskellige systemer til indfangning og transport af slagtekyllinger, og da lastbiler, modulsystem og transportkasser udgør et integreret system på hvert enkelt slagteri, er det svært at adskille effekten af faktorerne i observationelle studier. Det er også muligt, at forskellene skyldes procedurer, f.eks. forskelle i kriterier for påsætning og design af vinter-presenninger, reduktion af lastetæthed, præcision i lastning af de enkelte kasser eller håndtering af kyllingerne ved indfangning. Endelig kan højere slagtealder hos de ikke-delslagtede flokke transporteret til to af slagterierne sammenlignet med det tredje, være en del af forklaringen. I den separate model for ikke-delslagtede flokke transporteret til Slagteri A var slagtealder over 37 dage forbundet med højere DOA-% (Bilag 8, Tabel 4).

Længere ventetid på slagteriet var en risikofaktor i alle tre modeller, og på alle tre slagterier (Figur 3) på trods af, at designet af venteområdet varierer kraftigt mellem slagterierne. Risikoen for høj DOA-% steg med længere ventetid, hvilket tyder på, at ventilationen gennem transportkasserne med fordel kan forøges på alle slagterier. Selvom luftgennemstrømningen i og omkring transportmoduler er høj ($> 1\text{ m/s}$), kan den stadig være lav ($< 0,1\text{ m/s}$) gennem kasserne (Quinn et al., 1998). Flere studier har vist, at længere ventetid på slagteriet er forbundet med forhøjet risiko for DOA (Nijdam et al., 2004; Vieira et al., 2011), og angivet metabolisk stress pga. længere periode uden adgang til foder som årsag. Et brasiliansk studie i subtropisk klima har modsat vores studie indikeret, at et klimastyret venteområde kan nedbringe kyllingernes legemstemperatur efter transport og dermed modvirke DOA (Vieira et al., 2010).

Besætningsrelaterede faktorer

De besætningsrelaterede risikofaktorer havde overordnet set mindre effekt på risikoen for høj DOA-%. DOD-% var dog stærkt forbundet med DOA-% i alle tre modeller, hvilket måske skyldes overlap i registreringen af DOA- og DOD-%, da det som nævnt er en vurderingssag, hvilken kategori en død kylling registreres under ved ophængning. Dette bestyrkes af et canadisk studie der viste, at andelen af kyllinger, der var døde dagen før indtransport ikke var korreleret med DOA-% (Drain et al., 2007). Dette stemmer også overens med tidligere studier, hvor kun en mindre del af DOA-kyllingerne var døde af sygdomsmæssige årsager relateret til besætningen (Lund et al., 2013; Kittelsen et al., 2015). Risikofaktormodellerne blev kørt igen uden høj DOD-%, og det ændrede ikke parameterestimaterne for de andre risikofaktorer, hvorfor man kan se bort fra DOD-% uden at ændre på konklusionen.

De resterende besætningsrelaterede faktorer som alle havde mindre effekt på DOA, kan relateres til flokkens sundhedsstatus, management eller kyllingernes væksthastighed. Andelen af kyllinger kasseret af sygdomsmæssige årsager var forbundet med høj DOA-% i alle tre modeller og har også været rapporteret som forbundet med DOA i tidligere studier (Lupo et al., 2009). Dette kan indikere, at flokke med, eller hvor der tidligere har været sygdomsproblemer, er prædisponerede for at få høj DOA-% (Mitchell et al., 2004). At andelen af undermålerkyllinger også var relateret til høj DOA-% er ligeledes observeret i andre studier (Haslam et al., 2008). Andelen af selvdøde kyllinger i produktionsperioden var kun forbundet med DOA-% i delslagtede flokke, mens tidligere studier har indikeret modstridende sammenhænge (Drain et al., 2007; Haslam et al., 2008; Chauvin et al., 2011; Jacobs et al., 2016a). Fælles for studierne var dog, at dødelighedsprocenten kombinerede selvdøde og aflivede kyllinger, hvorfor en

høj dødelighed kan indikere såvel ringe som tilstrækkelig håndtering af sygdomsproblemer. Vores studie viste, at i tidligere delslagtede flokke var en lav andel af selvdøde til aflivede kyllinger i besætningen forbundet med en lavere risiko for høj DOA-%, hvilket understreger, at aflivning af små og syge kyllinger også bør være en del af en strategi for at minimere DOA. I delslagtede flokke var revaccination mod IB forbundet med højere DOA-%. Haslam et al. (2008) fandt omvendt en beskyttende effekt af vaccination (uden dog at skelne mellem forskellige vaccinationer). Årsagen hertil kan være relateret til immunsupprimering (Winterfield et al., 1978) og dermed lavere modstandsdygtighed overfor transportstress. Endelig var yngre forældredyr forbundet med risiko for høj DOA-% i ikke-delslagtede flokke, hvilket ikke tidligere har været rapporteret.

Gennemsnitlig daglig tilvækst var forbundet med høj DOA-% i ikke-delslagtede og tidligere delslagtede flokke og var stærkt korreleret (0,74-0,83) til gennemsnitlig slagtevægt i alle slagtegrupper. Andre studier har indikeret, at højere slagtevægt er en risikofaktor for DOA (Nijdam et al., 2004; Drain et al., 2007; Haslam et al., 2008), hvilket kan forklare, hvorfor gennemsnitlig daglig tilvækst ikke var en risikofaktor for delslagtede flokke, som er kendetegnet ved lavere slagtevægt. Hurtigt-voksende kyllinger som Ross 308-hybriden, der var hyppigst i Danmark i 2011-2014, har nedsat evne til at termoregulere og er derfor mere udsatte for at udvikle varmemstress (Sandercock et al., 2006), hvilket kan være en del af forklaringen på, hvorfor højere gennemsnitlig daglig tilvækst var en risikofaktor for høj DOA-%.

Fund af variation på CHR-niveau for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede flokke tyder på, at andre managementfaktorer, end de der var tilgængelige i KIK, også har betydning for DOA. Det kan f.eks. være varighed af faste, selvom et observationelt studie af en række risikofaktorer ikke fandt effekt heraf (Chauvin et al., 2011). Omvendt var variationen højest på Hus-indenfor-CHR-niveau i delslagtede flokke, hvilket tyder på, at egenskaber ved huset, snarere end management i besætningen, har betydning for risikoen for høj DOA-%. I det univariable modeltrin var % vingeskader ($P=0,0002$) forbundet med høj DOA-% i delslagtede flokke, hvilket kan tyde på, at husets indretning kan have særlig betydning for, hvor skånsomt en indfangning til delslagting kan udføres. Kyllinger, som er kommet til skade under indfangning vil angiveligt være prædisponerede for at dø af varme- eller kuldestress (Mitchell et al., 2004), ligesom traumatiske skader også har været rapporteret som en væsentlig dødsårsag hos DOA-kyllinger (Lund et al., 2013). Brugen af delslagting har ikke været inddraget i tidligere undersøgelser af risikofaktorer for DOA. Vores studie viste imidlertid, at vægtningen af risikofaktorerne varierer mellem slagtegrupperne. Brugen af delslagting var udbredt i besætninger, der leverede til Slagteri B og C modsat Slagteri A, hvorfor det kun er muligt at danne sig et indtryk af forskellene mellem delslagtede, tidligere delslagtede og ikke-delslagtede flokke ved at sammenligne prædiktionsmodellerne for Slagteri B. Figur 1-3 i Bilag 9 tyder på, at der er forskel på følsomheden overfor varme og kulde mellem slagtegrupperne. Delslagting udgør endvidere en risiko for indslæbning af smitte til huset og kan derfor være en belastning for resten af flokken indtil slagslagting (når huset tømmes for kyllinger få dage efter en delslagting), også som følge af metabolisk stress i forbindelse med fjernelse af foder og vand før indfangning. Desuden må åbning af huset, særligt i koldt vejr, forventes at ændre ventilationen i huset med risiko for kondensering.

Hvor præcist kan man forudsige høj DOA-% ud fra registerdata forud for transport?

På trods af at prædiktionsmodellerne var slagteri- og slagtegruppespecifikke og inkluderede de transportrelaterede faktorer, der havde størst betydning for DOA i risikofaktormodellerne, resulterede modellerne stadig i en høj andel af fejlklassifikationer (i bedste fald ca. 10-20 %), og som følge af

usikkerheden på parameterestimaterne skal resultaterne derfor fortolkes særdeles varsomt. Man vil muligvis kunne opnå en lavere fejlklassifikationsprocent, hvis flere faktorer fra risikofaktormodellerne var tilgængelige forud for transporten (f.eks. faktorer relevante for flokkens sundhedstilstand), men årsagen til den undervurderede risiko skal sandsynligvis findes i måleusikkerheden på variable, der indgår i prædiktionsmodellerne, f.eks. at gennemsnitstemperaturen ikke tager højde for lokale vejrfænomener, og at afstanden ikke tager højde for trafikale problemer, der kan have forlænget transporttiden. Det er derfor tvivlsomt, om et risikovurderingssystem bygget på disse fire prædiktionsmodeller kan opnå høj direkte effekt på dyrevelfærden i form af korrekt udpegning af højrisiko-flokke. Indirekte effekter opnået gennem øget fokus på risikofaktorerne fra – såvel branche som myndigheder – vil dog fremadrettet kunne være en væsentlig konsekvens af disse nye resultater, som ikke før har været tilgængelige under danske forhold.

Hvis man vælger en høj specificitet frem for sensitivitet og dermed højere grænseværdi for sandsynligheden for høj DOA-%, vil man få færrest falsk-positive og dermed lavere risiko for socioøkonomiske konsekvenser for erhvervet, men man må omvendt acceptere, at en lav andel af flokke med høj DOA-% vil blive udpeget korrekt (f.eks. 12 % af de ikke-delslagtede flokke transporteret til Slagteri A). Hvis man derimod vælger en lavere grænseværdi for at få udpeget flere høj-risikoflokke og dermed få mulighed for at målrette før-transport tiltag for at minimere DOA, må man acceptere, at en højere andel af de udpegede flokke reelt vil være falsk-positive, altså lav-risikoflokke i henhold til den valgte definition for lav DOA-% (for eksempler, se Bilag 10) Til rapporten er desuden vedlagt et vejledende risikovurderingsværktøj for ikke-delslagtede flokke, der skal transporteres til Danpo A/S. Dette excelværktøj kan give en indikation af sandsynligheden for, at en flok vil få høj DOA-%, men resultatet skal fortolkes og bruges varsomt på grund af de ovennævnte usikkerheder.

Vi kender ikke til andre studier, der har forsøgt at forudsige, om en kyllingeflok vil få høj DOA-%, men et enkelt studie har undersøgt, hvor præcist man kan forudsige høj kassationsprocent (Lupo et al., 2009). Lupo et al. (2009) fandt som os, at en prædiktionsmodel vil undervurdere risikoen for høj kassationsprocent.

Den tilsyneladende lavere fejlklassifikationsprocent for flokke transporteret til Slagteri A kan skyldes, at der kun blev benyttet data fra 2013 til at forudsige risikoen for høj DOA-% i 2014, modsat i modellerne for Slagteri B, hvor data fra 2011-2013 blev benyttet. Slagteri B udskiftede i oktober 2011 sit modulsystem, hvilket yderligere kan have forringet, hvor præcist modellerne kan prædiktere. I drift vil et risikovurderingssystem jævnligt skulle opdateres med nye data for at sikre, at vægtningen af risikofaktorerne svarer så godt til virkeligheden som muligt. Hvis data fra 2015 for eksempel inkluderes må der forventes en del ændringer i vægtningen af de besætningsrelaterede faktorer pga. det usædvanlige sygdomsbillede, som 2015 var præget af (Dahl, 2016). Det anbefales derfor, at data fra 2015 ikke benyttes til opdatering af systemet.

Anbefalinger til interventioner ved risiko for høj DOA-%

Risikofaktormodellerne kan bruges til at pege på interventionsmuligheder, der potentielt kan medvirke til at reducere DOA. De nedenfor foreslåede interventionsmuligheder skal ses i sammenhæng med logistikken omkring indfangning og transport. Slagtedatoen for en kyllingeflok fastsættes af slagteriet flere uger før kyllingerne indsættes, og der er efter slagteriernes oplysninger meget lidt mulighed for at ændre datoen på baggrund af kyllingernes performance. Derfor bør interventionsmuligheder fokusere

på mere generelle ændringer af procedurer og på udvikling og afprøvning af nyt udstyr til at skabe langsigtede reduktioner i DOA.

Da omgivelsernes temperatur var en af de væsentligste risikofaktorer er det relevant at tilpasse eventuelle interventioner til forskellige temperaturscenarier. I varmt vejr (over 15-20 °C) foreslås det derfor at lade lastede moduler blive i huset så længe som muligt, hvis temperaturen i huset er lavere end ude, og ventilationen kan opretholdes, og hvis muligt bruge mobile blæsere til at køle kyllingerne ned efter indfangning, som foreslået af Ritz et al. (2005). Desuden anbefales det at placere tomme moduler mellem de fyldte for at forbedre gennemstrømningen af luft. Vores resultater indikerer, at slagteriernes nuværende strategi, hvor de reducerer lastetætheden med 10 % fra ca. 25°C, sandsynligvis bør justeres til at reducere lastetætheden allerede fra ca. 15-20°C. Denne undersøgelse kan ikke pege på en præcis grænseværdi, men jo kortere afstand, des lavere bør lastetætheden være for at modvirke varmestress i ikke-delslagtede og delslagtede flokke. Det foreslås ligeledes at undersøge, hvorvidt det er muligt at differentiere lastetætheden i de enkelte moduler i forhold til, hvor på lastbilen, modulet skal placeres, hvorved man kan tage højde for den heterogene temperaturfordeling i læsset, hvor kyllinger i kasser forrest og øverst vil være udsat for de højeste temperaturer (Mitchell et al., 1998). Derfor anbefales det også at læsse modulerne fra bagenden mod fronten af lastbilen i varmt vejr.

Den kraftigt forøgede risiko for høj DOA-% ved temperaturer under 0°C indikerer, at vinterpresenningerne ikke har den ønskede effekt. I koldt vejr (under 0°C) anbefales det derfor, at de moduler, der er mest udsatte for kulde (nederst og bagest på lastbilen) lastes på til sidst, og at alle moduler bliver i huset så længe som muligt. Gardiner for porten til kyllingehuse kan angiveligt være med til at mindske kondensering og dermed modvirke, at kyllingerne bliver fugtige før selve transporten. Beskyttelse mod nedbør med presenninger under læsning anbefales ligeledes (Hunter et al., 1999). Der er særligt behov for en større opmærksomhed på ovenstående anbefalinger i besætninger, der ligger langt fra slagteriet.

Udover ovenstående specifikke anbefalinger i tilfælde af ekstreme temperaturer, kan andre tiltag potentielt også reducere DOA. Der var således i ca. 6 % af flokkene tale om gennemsnitlig højere lastetæthed end 160 cm²/kg, hvilket i sig selv udgør en risiko for høj DOA fra temperaturer over 0°C. Det kan ikke udelukkes, at det er udtryk for uens fyldning af transportkasserne, hvorfor det anbefales at indføre vejning af modulerne under fyldning. Derudover bør ventetiden på slagteriet minimeres. For ovennævnte anbefalinger gælder, at de er endnu mere vigtige under ekstreme temperaturforhold og ved lange afstande (men også korte, hvis i varmt vejr).

Brugen af delslagting har potentielt en række negative konsekvenser for flokkens sundhedstilstand, fødevarer sikkerhed og dyrevelfærd, og vores resultater indikerer, at såvel delslagtede som tidligere delslagtede flokke kan have forøget risiko for DOA. Det er generelt tilrådeligt, at slagtealderen holdes under 37 dage (Bilag 8, Tabel 4), særligt hvis flokken er i risiko for høj DOA som følge af andre risikofaktorer. Det bør undersøges nærmere, hvad der ligger bag de gentagne højere DOA-% hos tidligere delslagtede flokke leveret fra bestemte huse.

Ud over ovenstående tiltag, som slagterierne kan afprøve for at minimere DOA, bør producenterne ligeledes medvirke til at sikre, at slagtekyllinger, der indfanges er egnede til den forestående transport. Vores resultater indikerede, at rettidig aflivning af små og syge kyllinger kan reducere DOA. Undermålerkyllinger er eller har været syge og er derfor sandsynligvis prædisponerede for at dø under transport (Mitchell et al., 2004). Det anbefales derfor, at undermålerkyllinger og andre kyllinger, der viser tegn på sygdom, aflives i besætningen før indfangning. Den akkumulerede dødelighed, som indgår

som velfærdsindikator i Slagtekyllingedirektivet (EF/43/2007), optælles som andelen af selvdøde og aflivede kyllinger i besætningen. At aflivede kyllinger tælles med, kan imidlertid potentielt være en barriere for at aflive små og syge kyllinger før indfangning, hvis producenten er tæt på grænsen for maksimal akkumuleret dødelighed.

Nye hypoteser genereret i projektet samt forslag til fremtidige undersøgelser

En række potentielle risikofaktorer var ikke tilgængelige i KIK-databasen, såsom varighed af faste før indfangning, brug af vinter-presenninger på lastbiler og procedurer under indfangning og læsning. Variansen på CHR-niveau indikerede en høj variation mellem producenter mht. DOA, og det er derfor relevant at undersøge, hvilke management-faktorer, der giver anledning til disse forskelle. Det foreslås derfor at designe et kvalitativt studie, hvor producenter udvælges på baggrund af deres DOA og evt. afstand til slagteriet for på den måde at kunne undersøge betydningen af managementfaktorer, såsom brug af delslagting, varighed af faste og kriterier for aflivning af kyllinger.

I lyset af forventede globale klimaforandringer med højere temperaturer til følge, er det helt essentielt, at slagtekyllingeindustrien forbedrer deres strategier for transport i varmt vejr. På baggrund af studiets resultater er der behov for at undersøge betydningen af strategier omkring indfangning og læsning i forskellige vejrforhold for risikoen for temperaturstress og DOA. Fremtidige studier bør undersøge, hvordan design og procedurer ved anvendelsen af lastbiler, modulsystemer og transportkasser i højere grad kan beskytte kyllingerne mod ekstreme temperaturer. Der er behov for mere forskning i hensigtsmæssige måder at minimere kulde- og paradoksalt varmetress i koldt vejr, herunder særligt fokus på at minimere fugt i kasserne. Der er særligt behov for forskning i alternativer til passivt ventilerede lastbiler, der kan fordele den fugt og varme kyllingerne producerer, ved transport i koldt vejr og sikre tilstrækkelig luftgennemstrømning i varmt vejr.

Der var stor variation i andelen af vingeskader registreret på de tre slagterier og fordelingen af data tyder på mangelfuld registrering. Der er derfor behov for at udvikle og implementere en valideret metode til overvågning af sådanne skader. Der var signifikante forskelle ($P < 0,01$) mellem fangerhold i de univariable modeller for alle tre slagtegrupper, hvilket tyder på, at det er relevant at undersøge fangerholdenes håndtering af kyllingerne.

Høj datakvalitet er helt essentielt for at kunne benytte registerdata til udpegning af højrisiko-flokk. Datatabet i dette studie, bl.a. som følge af formodede fejlregistreringer, på ca. 18 % og variationen mellem slagterier mht. parametre registreret af slagteripersonalet og veterinærkontrollen tyder på, at der er behov for øget fokus på datakvaliteten for at forbedre mulighederne for at bruge registerdata meningsfyldt til overvågning af dyrevelfærd i slagtekyllingeproduktionen. Det foreslås at undersøge, hvordan flere processer for dataregistrering og -håndtering kan automatiseres. Automatisering kunne også være en vej til at opnå større ensartethed i veterinærkontrollens registreringer.

I lyset af resultaterne af dette studie foreslås det derudover at undersøge, hvorvidt der kan findes et alternativ til transport af levende slagtekyllinger, fx mobile slagterier, som kan slagte en hel kyllingeflok i besætningen. Fordelene ved at sådant system kan være: kortere varighed af håndtering af kyllingerne, lavere risiko for temperaturstress og deraf reduceret velfærd og kødkvalitet, hurtig aflivning af kyllinger med skader fra indfangning, højere slagtevægt og bedre kødkvalitet gennem minimering af fysiologisk stress og dehydrering. En undersøgelse af et sådant system bør involvere en cost-benefit-analyse, som tager både velfærd, slagtevægt, kødkvalitet og smittebeskyttelse i betragtning.

Konklusion

Som den første undersøgelse af sin art i Danmark har dette studie på et meget stort datamateriale belyst, hvilke risikofaktorer, der er forbundet med høj DOA-% i danske slagtekyllingeflokke. Samlet set peger resultaterne på, at karakteristika ved transporten (såsom temperatur, afstanden fra besætning til slagteri og slagteriet) i højere grad end ved besætningen/kyllingerne (såsom flokkens sundhedstilstand) har betydning for, om en flok registreres med høj DOA-% på slagteriet. Fund af variation på CHR-niveau for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede flokke tyder på, at andre managementfaktorer, end de der var tilgængelige i KIK-databasen, imidlertid også har betydning for DOA. Overordnet set bekræfter disse resultater en række tidligere studier. Der er dog behov for fokus på forbedring af datakvaliteten, hvis data fremadrettet skal kunne benyttes til risikovurderingssystemer. De fire prædiktionsmodeller resulterede i mange fejlklassifikationer, når den prædikterede sandsynlighed for høj DOA-% i 2014 blev beregnet ud fra modeller baseret på data fra 2011-2013. Som følge af usikkerhederne skal den beregnede prædikterede sandsynlighed for høj DOA-% derfor fortolkes og bruges varsomt. Det konkluderes, at et risikovurderingssystem bygget på modellerne vil resultere i korrekt udpegning af få højrisiko-flokke, og samtidig medføre mange fejlklassificeringer. Endelig peger undersøgelsen på, at interventioner for at reducere DOA, og dermed øge transportegnetheden hos kyllingerne, bør fokusere på langsigtede ændringer af procedurer og afprøvning af nyt udstyr, der i højere grad kan beskytte kyllingerne mod vejrliget, sideløbende med øget fokus på kyllingernes egnethed til den forestående transport fra producenternes side.

Referencer

- Bayliss, P. A. & Hinton, M. H. (1990). Transportation of broilers with special reference to mortality rates. *Applied Animal Behaviour Science* 28(1-2): 93-118.
- Burlinguet, N. A., Strawford, M. L., Watts, J. M., Classen, H. L., Shand, P. J. & Crowe, T. G. (2012). Broiler trailer thermal conditions during cold climate transport. *Canadian Journal of Animal Science* 92(2): 109-122.
- Chauvin, C., Hillion, S., Balaine, L., Michel, V., Peraste, J., Petetin, I., Lupo, C. & Bouquin, S. (2011). Factors associated with mortality of broilers during transport to slaughterhouse. *Animal* 5(2): 287-293. 219 ref.
- Dadgar, S., Lee, E. S., Leer, T. L. V., Burlinguet, N., Classen, H. L., Crowe, T. G. & Shand, P. J. (2010). Effect of microclimate temperature during transportation of broiler chickens on quality of the pectoralis major muscle." *Poultry Science* 89(5): 1033-1041.
- Dahl, J. (2016). Sygdomssituationen i dansk slagtefjerkræ det sidste år. Hentet: 07.11.2016, fra <http://danskslagtefjerkrae.dk/aktuelt/nyhedsbreve-fra-dansk-slagtefjerkrae/2015/november-2015/sygdomssituationen#.WCDmwUozXug>.
- Danmarks Statistik, D. (2016). ANI6: Slagtninger og produktion af fjerkræ fordelt efter kategori og enhed (år). Hentet: 07.11.2016, fra <http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366>.
- Deeb, N., Shlosberg, A. & Cahaner, A. (2002). Genotype-by-environment interaction with broiler genotypes differing in growth rate. 4. Association between responses to heat stress and to cold-induced ascites. *Poultry Science* 81(10): 1454-1462.
- Drain, M. E., Whiting, T. L., Rasali, D. P. & D'Angiolo, V. A. (2007). Warm weather transport of broiler chickens in Manitoba. I. Farm management factors associated with death loss in transit to slaughter. *Canadian Veterinary Journal* 48(1): 76-80. 15 ref.

- Haslam, S. M., Knowles, T. G., Brown, S. N., Wilkins, L. J., Kestin, S. C., Warriss, P. D. & Nicol, C. J. (2008). Prevalence and factors associated with it, of birds dead on arrival at the slaughterhouse and other rejection conditions in broiler chickens. *British Poultry Science* 49(6): 685-696.
- Hunter, R. R., Mitchell, M. A. & Carlisle, A. J. (1999). Wetting of broilers during cold weather transport: A major source of physiological stress? *British Poultry Science* 40(sup001): 48-49.
- Hunter, R. R., Mitchell, M. A. & Matheu, C. (1997). Distribution of 'dead on arrivals' within the bio-load on commercial broiler transporters: correlation with climatic conditions and ventilation regimen. *British Poultry Science* 38(Supplement): S7-S9.
- Jacobs, L., Delezie, E., Duchateau, L., Goethals, K. & Tuytens, F. A. M. (2016a). Broiler chickens dead on arrival: associated risk factors and welfare indicators. *Poultry Science*.
- Jacobs, L., Delezie, E., Duchateau, L., Goethals, K. & Tuytens, F. A. M. (2016b). Impact of the separate pre-slaughter stages on broiler chicken welfare. *Poultry Science*.
- Kettlewell, P. J., Hoxey, R. P. & Mitchell, M. A. (2000). Heat produced by broiler chickens in a commercial transport vehicle. *Journal of Agricultural Engineering Research* 75(3): 315-326.
- Kittelsen, K. E., Granquist, E. G., Kolbjørnsen, Ø., Nafstad, O. & Moe, R. O. (2015). A comparison of post-mortem findings in broilers dead-on-farm and broilers dead-on-arrival at the abattoir. *Poultry Science* 94(11): 2622-2629.
- Knezacek, T. D., Olkowski, A. A., Kettlewell, P. J., Mitchell, M. A. & Classen, H. L. (2010). Temperature gradients in trailers and changes in broiler rectal and core body temperature during winter transportation in Saskatchewan. *Canadian Journal of Animal Science* 90(3): 321-330.
- Lund, V. P., Kyvsgaard, N. C., Christensen, J. P. & Bisgaard, M. (2013). Pathological manifestations observed in dead-on-arrival broilers at a Danish abattoir. *British Poultry Science* 54(4): 430-440.
- Lupo, C., Bouquin, S. I., Balaine, L., Michel, V., Peraste, J., Petetin, I., Colin, P. & Chauvin, C. (2009). Feasibility of screening broiler chicken flocks for risk markers as an aid for meat inspection. *Epidemiology and Infection* 137(8): 1086-1098.
- Mitchell, M. A. & Kettlewell, P. J. (1998). Physiological stress and welfare of broiler chickens in transit: solutions not problems! *Poultry Science* 77(12): 1803-1814.
- Mitchell, M. A. & Kettlewell, P. J. (2004). *Transport and handling*. C. A. Weeks & A. Butterworth. Wallingford, CABI Publishing.
- Nijdam, E., Arens, P., Lambooij, E., Decuypere, E. & Stegeman, J. A. (2004). Factors influencing bruises and mortality of broilers during catching, transport, and lairage. *Poultry science* 83(9): 1610-1615.
- Part, C. E., Edwards, P., Hajat, S. & Collins, L. M. (2016). Prevalence rates of health and welfare conditions in broiler chickens change with weather in a temperate climate. *Royal Society Open Science* 3(9).
- Petracci, M., Bianchi, M. & Cavani, C. (2005). Pre-slaughter factors affecting mortality, live weight loss, and carcass quality in broiler chickens. *Proceedings of the XVII European Symposium on the Quality of Poultry Meat and XI European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products*, Doorwerth, Netherlands.
- Petracci, M., Bianchi, M. & Cavani, C. (2010). Pre-slaughter handling and slaughtering factors influencing poultry product quality. *World's Poultry Science Journal* 66(1): 17-26.

- Quinn, A. D., Kettlewell, P. J., Mitchell, M. A. & Knowles, T. (1998). Air movement and the thermal microclimates observed in poultry lairages. *British Poultry Science* 39(4): 469-476.
- Ritz, C. W., Webster, A. B. & Czarick, M., III (2005). Evaluation of hot weather thermal environment and incidence of mortality associated with broiler live haul. *Journal of Applied Poultry Research* 14(3): 594-602.
- Sandercock, D. A., Hunter, R. R., Mitchell, M. A. & Hocking, P. M. (2006). Thermoregulatory capacity and muscle membrane integrity are compromised in broilers compared with layers at the same age or body weight. *British Poultry Science* 47(3): 322-329.
- Strawford, M. L., Watts, J. M., Crowe, T. G., Classen, H. L. & Shand, P. J. (2011). The effect of simulated cold weather transport on core body temperature and behavior of broilers. *Poultry Science* 90(11): 2415-2424.
- Taylor, N. L., Fletcher, D. L., Northcutt, J. K. & Lacy, M. P. (2001). Effect of transport cage height on broiler live shrink and defecation patterns. *Journal of Applied Poultry Research* 10(4): 335-339.
- Vecerek, V., Grbalova, S., Voslarova, E., Janackova, B. & Malena, M. (2006). Effects of travel distance and the season of the year on death rates of broilers transported to poultry processing plants. *Poultry Science* 85(11): 1881-1884.
- Vecerek, V., Voslarova, E., Conte, F., Vecerkova, L. & Bedanova, I. (2016). Negative Trends in Transport-related Mortality Rates in Broiler Chickens. *Asian Australas. J. Anim. Sci* 29(12): 1796-1804.
- Vieira, F. M. C., Silva, I. J. O., Barbosa Filho, J. A. D., Vieira, A. M. C. & Broom, D. M. (2011). Preslaughter mortality of broilers in relation to lairage and season in a subtropical climate. *Poultry Science* 90(10): 2127-2133.
- Vieira, F. M. C., Silva, I. J. O. d., Barbosa Filho, J. A. D. & Vieira, A. M. C. (2010). Productive losses on broiler preslaughter operations: effects of the distance from farms to abattoirs and of lairage time in a climatized holding area. *Revista Brasileira de Zootecnia* 39(11): 2471-2476.
- Warriss, P. D., Bevis, E. A., Brown, S. N. & Edwards, J. E. (1992). Longer journeys to processing plants are associated with higher mortality in broiler chickens. *British Poultry Science* 33(1): 201-206.
- Warriss, P. D., Knowles, T. G., Brown, S. N., Edwards, J. E., Kettlewell, P. J., Mitchell, M. A. & Baxter, C. A. (1999). Effects of lairage time on body temperature and glycogen reserves of broiler chickens held in transport modules. *Veterinary Record* 145(8): 218-222.
- Warriss, P. D., Pagazaurtundua, A. & Brown, S. N. (2005). Relationship between maximum daily temperature and mortality of broiler chickens during transport and lairage. *British Poultry Science* 46(6): 647-651.
- Watts, J. M., Graff, L. J., Strawford, M. L., Crowe, T. G., Burlingette, N. A., Classen, H. L. & Shand, P. J. (2011). Heat and moisture production by broilers during simulated cold weather transport. *Poultry Science* 90(9): 1890-1899.
- Whiting, T. L., Drain, M. E. & Rasali, D. P. (2007). Warm weather transport of broiler chickens in Manitoba. II. Truck management factors associated with death loss in transit to slaughter. *Canadian Veterinary Journal* 48(2): 148-154.
- Whyte, P., Collins, J. D., McGill, K., Monahan, C. & O'Mahony, H. (2001). The effect of transportation stress on excretion rates of *Campylobacters* in market-age broilers. *Poultry Science* 80(6): 817-820.
- Winterfield, R. W., Hoerr, F. J. & Fadly, A. M. (1978). Vaccination Against Infectious Bronchitis and the Immunosuppressive Effects of Infectious Bursal Disease. *Poultry Science* 57(2): 386-391.

Yahav, S., Shinder, D., Tanny, J. & Cohen, S. (2005). Sensible heat loss: the broiler's paradox. *World's Poultry Science Journal* **61**(3): 419-434.

Bilag til Delprojekt 1



Foto: Anja Brinch Riber, AU

Beskrivelse af KIK-databasen

KIK (Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen) er et kvalitets- og dokumentationssystem, der har været i drift siden 2010. Databasen modtager data fra alle led af den danske slagtekyllingeproduktionskæde, herunder rugerier, foderstofvirksomheder, kyllingeproducenter, fangerhold, transportører, slagterier og veterinærkontrollen. KIK-databasen samler data på både ejendoms- og flokniveau for konventionelt opdrættede slagtekyllingeflokke. I foråret 2016 forlod den ene af de store fjerkræslagterivirksomheder KIK-systemet.

Vi modtog følgende variable fra KIK-databasen med beskrivelse fra Lyngsøe Systems, der administrerer databasen:

Variabel	Beskrivelse
CHR	Ejendom, besætningsnummer
HUS	Hus nummer på ejendom
ROTATION	Kyllinge hold nummer. Første hold fra et hus slagtet i 2015 er rotation 201501, det næste hold er 201502 o.s.v.
SLAGTERI	Slagteri
SLAGTERI_EOF	Slagteri aut. nummer, EØF
ANTAL_KYLLINGER	Samlet antal kyllinger, som er transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn inklusiv antal døde under indfangning efterladt i huset. Indberettet af slagteri.
ANTAL_KYLLINGER_SLAGTET	Antal slagtede (ophængte) kyllinger, som er transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn. Indberettet af slagteri.
ANTAL_KG	Den samlede vægt på det samlede antal kyllinger fra ét hus på én rotation, som er transporteret til samme slagteri i et slagtedøgn. Indberettet af slagteri
FANGER_HOLD	Indfangningsfirma, der har indfanget de kyllinger, som er transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn. Indberettet af slagteri.
FANGE_MASKINE_ID	KIK ID for den fangemaskine, der er anvendt til indfangning af de kyllinger, som er transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn
FANGE_MASKINE_NAVN	Fangemaskine navn, der er anvendt til indfangning af de kyllinger, som er transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn. Indberettet af slagteri.
FANGE_MASKINE_TYPE	Fangemaskine type, der er anvendt til indfangning af kyllingerne. Indberettet af slagteri.
ANTAL_MODULER	Samlet antal moduler med kyllinger transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn. Indberettet af slagteri.
START_LAES	Tidspunktet for start af læsning af første vognlæs fra

AFGANG	hus. Indberettet af slagteri. Tidspunktet for afgang fra ejendom for første vognlæs fra hus. Indberettet af slagteri.
ANKOMST	Tidspunktet for ankomst til slagteri for første vognlæs fra hus. Indberettet af slagteri.
START_SLAGTNING	Tidspunktet for start af slagtning for første vognlæs fra hus. Indberettet af slagteri.
ER_DELSLAGTNING	Hvis slagteholdet er en delslagtning (udtynding) er værdien i denne kolonne 1. For slagtehold, som er slutslagtning eller slagtning af et helt hold er værdien 0.
NO_OF_SETTLEMENT_GROUPS	Delslagtede hold er markeret med 0. Hold der er afregnet/slagt som ét slagtehold er markeret med 1.
HASE_SVIDNINGER	Sorte haser. Indberettet af slagteri, men slagterierne registrerer ikke hasesvidninger på samme måde.
VINGESKADER	Vingeskader. Indberettet af slagteri, men slagterierne registrerer ikke vingeskader på samme måde.
KASS_AFMAG_LUGT_MISFARV	Antal kasseret, afmagring/abnorm lugt/misfarvning.
KASS_BUGVATTERSOT	Antal kasseret, bugvattersot
KASS_LEDBETAENDELSE_FORANDRING	Antal kasseret, ledbetændelse
KASS_HUDBETAENDELSE	Antal kasseret, hud
KASS_HJERTESAEKBETAENDELSE	Antal kasseret, hjerte
KASS_LUFTSAEKBET_PERITONITIS	Antal kasseret, lunger/luftsække
KASS_LEVER	Antal kasseret, lever
KASS_BUGHINDER_AEGGELDER	Antal kasseret, bughinde/æggeleder
KASS_DIVERSE	Antal kasseret pga. sygdom, andet
KASS_AFMAGRING	Antal kasseret, afmagring
KASS_MISFARVNING	Antal kasseret, misfarvning
KASS_RIFTER	Antal kasseret, rifter
KASS_AKUT_LEVERBETAENDELSE	Antal kasseret, akut leverbetændelse
KASS_KRONISK_LEVERFORANDRING	Antal kasseret, kronisk leverforandring
KASS_BRUD_BLOEDNINGER	Antal kasseret, brud og blødninger
KASS_AFBLOD_MASKIN	Antal kasseret, manglende afblødning, maskinskade, andet
TP_NO_OF_0	Antal kyllinger med trædepude bedømmelse 0
TP_NO_OF_1	Antal kyllinger med trædepude bedømmelse 1
TP_NO_OF_2	Antal kyllinger med trædepude bedømmelse 2
KASS_SMAA	Antal små, aflivet før slagtning
CV	CV tal
DOA	Antal døde under transport (DOA) til slagteriet
DOA_PCT_DELIVERED	% DOA. Antal døde under transport (DOA) til slagteriet i forhold til samlet antal kyllinger, som er transporteret til slagtning.
DOD	Antal, som er fundet døde hos producent under indfangning af et slagtehold. Det er kyllinger, som tydeligt ser ud til at have været døde før indfangningen er startet
ILLNESS	Antal syge, aflivet før slagtning

DDC	Antal døde under indfangning
SLAUGHTER_AGE	Alderen målt i dage af de kyllinger som er transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn
WEIGHT_ALIVE	Gennemsnitsvægten på de kyllinger der er transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn
CONDEMNATION_PCT_DELIVERED	% kasserede. Antal kasserede (alle kassationsårsager med diagnose samt manglende afblødning og maskinel beskadigelse) i forhold til samlet antal kyllinger, som er transporteret til slagtning.
KASS_ILLN_DOA_PCT_DELIVERED	% kasserede med diagnose (alle kassationsårsager med diagnose undtagen KASS_AFBLOD_MASKIN) samt DOA i forhold til samlet antal kyllinger, som er transporteret til slagtning.
ROT_MORTALITY	% manglende, beregnet som differencen mellem antal daggamle kyllinger indsat i huset, og det samlede antal kyllinger fra huset som er transporteret til slagtning (pr rotation)
ROT_FCR	Kg foder anvendt pr kg levende vægt (pr rotation)
ROT_AVERAGE_HEN_AGE	Den gennemsnitlige hønealder i uger for de daggamle kyllinger som er indsat i ét hus i én rotation
ROT_NUMBEROFPARENTFLOCKS	Antal forældreflokke. Hvis alle æg stammer fra samme forældreflok er værdien 1
PARENT_FLOCK_ID	Rugeri ID (flok nummer og indsættelsesdato) for den rugeægsproduktionsflok (forældreflok), som har leveret de fleste æg til et hold kyllinger i ét hus
NUMBER_OF_EGGS_PCT	Den % andel af æggene, der stammer fra hønseflokken som har leveret de fleste æg til et hold kyllinger i ét hus
ROT_CALCULATED_MAX_DENSITY	Den højeste belægningsgrad (kg pr m ²) beregnet i ét hus på et tidspunkt (given slagtealder) hvor der foretages slagtning (slagte/afregningshold) i løbet af én rotation
ROT_CHICKS_PLACED	Antal indsatte daggamle kyllinger i ét hus i én rotation
ROT_ONSET_DATE	Indsættelsesdato for de daggamle kyllinger i ét hus i én rotation
ROT_FIRST_WEEK_DEAD_PCT	Den andel (%) af kyllinger som er døde (morgen+aften) eller aflivet (morgen+aften) den første uge ud af det antal daggamle kyllinger som er indsat i ét hus i én rotation
ROT_ILLNESS_TREATMENTS	Antal sygdomsbehandlinger i ét hus i én rotation
ROT_IB_VACCINE	Antal vaccinationer mod Infektiøs Bronchitis (IB) i ét hus i én rotation
ROT_GUMBORO_VACCINE	Antal vaccinationer mod Gumboro (IBD) i ét hus i én rotation
ROT_CULL_PCT_OF_PLACED	% aflivede. Antal aflivede (af producenten) kyllinger (registreret morgen+aften) i forhold til antal indsatte daggamle kyllinger i ét hus i én rotation
ROT_CULL_DEAD_PCT_OF_PLACED	% aflivede og døde. Antal aflivede (af producenten) og døde kyllinger (registreret morgen+aften) i

ROT_DIFF	forhold til antal indsatte daggamle kyllinger i ét hus i én rotation Difference mellem antal indsatte kyllinger (ROT_CHICKS_PLACED) fratrullet samlet antal døde i opdrætsperioden indberettet af landmanden og antal kyllinger leveret fra huset (sum af ANTAL_KYLLINGER for rotationen)
ROT_DIFF_PCT	Difference i % med ROT_CHICKS_PLACED som denominator
MANUAL_REG_BY_PRODUCER	Værdien 1 i kolonnen markerer slagtehold, hvor producenten selv har registreret slagteri data.

Bilag 2, delprojekt 1.

Oversigt over variable, der blev testet i de univariable modeller. Variable stammer fra KIK, DMI eller er beregnet på basis af variable herfra. Variable, der blev benyttet til at beregne andre variable, men som ikke blev testet i de univariable modeller, er ikke medtaget i tabellen. De variable er listet efter, hvilken fase i produktionskæden, de vedrører, beskrivelse af hvordan registreret/beregnet og af hvem, antal observationer i det samlede datasæt (n=14.515) eller per kategori ved kategoriske variable. Gennemsnit, standardafvigelse, minimum og maksimum er angivet, enten for alle observationer eller per kategori.

	Variabel	Beskrivelse og hvordan registreret (KIK/DMI og/eller beregning)	n og/eller n per kategori	Gennemsnit	Standard-afvigelse	Min-Max
	DOA-%	% døde under transport (DOA) til slagteriet i forhold antal transporterede, registreret af slagteriet ved ophængning. En DOA-kylling er vurderet som død efter indfangningens begyndelse. Kategoriseret som: Høj: > 0,342 % Lav: <= 0,342 %	14.515 Høj: 2.172 Lav: 12.343	0,27	0,40	0,003-21,18
Datastruktur						
	CHR nummer	Identifikationsnummer for besætningen fra det Centrale Husdyrbrugs Register.	155 CHR numre: 27-527 flokke per CHR nummer.	-	-	-
	Hus indenfor CHR nummer	'Random effect' bestående af CHR nummer og Hus	356 kombinationer: 27-74 flokke per kombination.	-	-	-
	Rotation	Produktionscyklusnummer. En cyklus starter, når et hold daggamle kyllinger indsættes i et hus. Første hold fra et hus slagtet i 2011 er rotation 201101, det næste hold er 201102 osv.	36 rotationer i alt	-	-	-
	Slakteri	Slakteriet, som flokken er transporteret til.	Slakteri A: 6.073 Slakteri B: 5.085 Slakteri C: 3.357	-	-	-
	Slagtegruppe	<u>Delslagt</u> : Den første delslagting af en population af kyllinger, der er opdrættet i samme hus indenfor et CHR nummer. <u>Tidligere delslag</u> : Slutslagting eller anden eller tredje delslagting (30 observationer) af en population af kyllinger, der er opdrættet i samme hus indenfor et CHR nummer. <u>Ikke-delslagt</u> : En population af kyllinger opdrættet i samme hus indenfor CHR nummer, der transporteres til slagting på samme dag.	Delslagt: 3.528 Tidligere delslag: 3.455 Ikke-delslagt: 7.532	-	-	-
	År	År, hvor læsning startede.	2011: 3.846 2012: 3.670 2013: 3.616 2014: 3.383	-	-	-
	Ugedag	Ugedag, hvor læsning startede. Lørdag og søndag blev lagt sammen til Weekend pga. af for få	Mandag: 3.102 Tirsdag: 2.778	-	-	-

		observationer på lørdage.	Onsdag: 2.747 Torsdag: 2.823 Fredag: 1.078 Weekend: 1.987			
Besætningsrelaterede faktorer						
Forældreflok	Forældreflok_ID	Kombination af forældreflok-besætningsnummeret og det årstal forældreflokken blev indsat, indberettet af rugeriet. I 6.055 observationer var der mere end en forældreflok, der havde leveret æg til slagtekyllingeflokken, og forældreflokken kunne derfor ikke entydigt identificeres.	179 forældreflokke: 1-196 slagtekyllingeflokke per forældreflok.	-	-	-
	Forældreflokkens alder	Gennemsnitlig alder (i uger) for alle forældredyrsflokke, der har leveret kyllinger til en slagtekyllingeflok, indberettet af rugeriet. Når der er flere forældredyrsflokke er høne-gennemsnitsalderen beregnet som summen af antal æg gange hønealder for de forældredyrsflokke, som har leveret æg til et hold kyllinger, set i forhold til antal indsatte kyllinger i huset.	14.515	41,1	9,7	24-64
Opdrætsperioden	Antal kyllinger indsat	Antal indsatte daggamle kyllinger i ét hus i én rotation. Registreret af rugeriet ved læsning af 100 kyllinger per transportkasse, kasserne vejes som kontrol.	14.515	33.341	8.850	4.300-66.700
	% Døde i første uge	Den andel (%) af kyllinger, som producenten har registreret som døde (morgen+aften) eller aflivet (morgen+aften) i den første uge ud af det antal daggamle kyllinger, som er indsat i ét hus i én rotation	14.422	0,95	0,61	0,04-13,59
	IB vaccination	Revaccination mod Infektiøs Bronchitis (IB) i ét hus i én rotation, registreret af producenten.	Ja: 10.013 Nej: 4.502	-	-	-
	Gumboro vaccination	En eller flere vaccinationer mod Gumboro (IBD) i ét hus i én rotation, registreret af producenten.	Ja: 4.889 Nej: 9.626	-	-	-
	Behandling	En eller flere sygdomsbehandlinger i ét hus i én rotation, registreret af producenten.	Ja: 581 Nej: 13.934	-	-	-
	% Aflivede	% aflivede kyllinger (morgen+aften) i forhold til antal indsatte daggamle kyllinger i ét hus i én rotation, registreret af producenten.	13.637	0,82	0,61	0,01-8,59
	% Selvdøde	% selvdøde kyllinger (morgen+aften) i forhold til antal indsatte daggamle kyllinger i ét hus i én rotation, registreret af producenten.	14.492	2,37	1,21	0,03-28,65
	Difference mellem % beregnet dødelighed og % registreret dødelighed	Difference mellem % beregnet dødelighed, beregnet af slagteriet som differencen mellem antal daggamle kyllinger indsat i huset og det samlede antal kyllinger fra huset, som er transporteret til slagtning (pr rotation) og registreret dødelighed (% aflivede og % døde kyllinger), registreret af producenten (morgen+aften) i forhold til antal indsatte daggamle kyllinger i ét hus i én rotation. Kategoriseret som:	Høj+: 3.140 Lav/høj-: 11.201	0,36	2,20	-21,95-76,29

Bilag 2, delprojekt 1.

		Høj+: > 0,8 %-point Lav/høj-: <= 0,8 %-point				
	Ratio mellem % selvdøde og % aflivede	Ratio mellem % selvdøde og % aflivede, registreret af producenten, i ét hus i én rotation. Kategoriseret som: Høj: > 1,25 Lav: <= 1,25	Høj: 12.495 Lav: 1.134	6,99	19,82	0,01-576,00
	FCR (feed-conversion-rate)	Fodereffektivitet beregnet som kg foder anvendt pr kg levende vægt (pr rotation), beregnet af slagteriet.	14.318	1,63	0,09	1,02-2,37
	Maksimal belægningsgrad	Den højeste belægningsgrad (kg pr m2) beregnet i ét hus på et tidspunkt (given slagtealder), hvor der foretages slagtning (slagte/afregningshold) i løbet af én rotation, beregnet af slagteriet.	14.441	39,31	2,84	25,02-53,18
	Gennemsnitlig slagtevægt	Gennemsnitsvægten (i g) på de kyllinger, der er transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn, beregnet af slagteriet.	14.515	2.099	192	1.352-2.866
	Slagtealder	Alderen målt i dage af de kyllinger, som er transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn, beregnet af slagteriet. Kategoriseret som: Høj: > 37 dage Lav: <= 37 dage	14.515 Høj: 3.456 Lav: 11.059	35,5	2,1	29,4-43,6
	Gennemsnitlig daglig tilvækst	Gennemsnitlig levende vægt per levedøgn i dage (i g/dag), beregnet på baggrund af gennemsnitlig slagtevægt og slagtealder.	14.511	59,09	3,58	40,74-69,88
	Trædepudeflokscore	Trædepudeflokscoren beregnet ud fra antallet af kyllingefødder med score 0, 1 og 2, indberettet af veterinærkontrollen: Trædepudeflokscore = 0,5 * (antal fødder scoret 1) + 2 * (antal fødder scoret 2). Kategoriseret som: Lav: <= 40 Moderat: > 40 & <= 80 Høj: > 80	Lav: 11.217 Moderat: 2.313 Høj: 985	28,53	30,75	0,00-200,00
	Undermålerkyllinger	% undermålerkyllinger (små kyllinger), aflivet før slagtning ud af alle transporterede kyllinger fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn, registreret af slagteriet.	14.515	0,05	0,08	0,00-4,42
	% kasserede kyllinger af sygdomsmæssige årsager	Summen af kyllinger kasseret med følgende diagnosekategorier: bugvattersot, misfarvning, ledbetændelse, hudbetændelse, hjertesækbetændelse, luftsækbetændelse/peritonitis, rifter, akut og kronisk leverbetændelse, indberettet af veterinærkontrollen. I procent i forhold til antal slagtede kyllinger.	13.974	0,74	0,57	0,00-14,78
	% døde kyllinger før indfangning (DOD)	% kyllinger, der tydeligt ser ud til at have været døde før indfangningen i forhold til antal transporterede kyllinger fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn, registreret på slagteriet ved ophængning i forbindelse med optælling af DOA-kyllinger. Kategoriseret som:	Høj: 1.535 Lav: 12.980	0,02	0,03	0,00-1,68

		Høj: >0,05 % Lav: ≤ 0,05 %				
Forskudte besætningsvariable	Gns. DOA-% for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer	Gns. DOA-% for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer. Beregnet separat for delslagtede (D) flokke og for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede (IDT) flokke.	D: 2.726 IDT: 10.987	D: 0,29 IDT: 0,26	D: 0,29 IDT: 0,22	D: 0,05-5,20 IDT: 0,07-7,20
	Gns. total dødelighedsprocent (% selvdøde og % aflivede) for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer	Gns. total dødelighedsprocent (% selvdøde og % aflivede) for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer, registreret af producenten. Kategoriseret som: Høj: > 4,00 % Lav: ≤ 4,00 %	10.987 Høj: 1.531 Lav: 8.333	3,19	0,98	0,75-15,8
	Gns. DOD-% for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer	Gns. DOD-% for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer. Beregnet separat for delslagtede (D) flokke og for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede (IDT) flokke.	D: 2.726 IDT: 10.987	D: 0,02 IDT: 0,02	D: 0,02	D: 0-0,49 0,00-0,56
	Gns. difference mellem % beregnet dødelighed og % registreret dødelighed for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer	Gns. difference mellem % beregnet dødelighed og % registreret dødelighed for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer. Kategoriseret som: Høj+: > 0,8 %-point Lav: ≤ 0,8 %-point & > 0,8 %-point Høj-: ≤ -0,8 %-point	9.639 Høj+: 1.715 Lav: 7.573 Høj-: 351	0,36	1,38	-6,00-26,00
	Gns. total kassationsprocent for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer	Gns. total kassationsprocent (uden maskinskader) for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer. Beregnet separat for delslagtede (D) flokke og for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede (IDT) flokke.	D: 2.719 IDT: 10.987	D: 0,89 IDT: 0,92	D: 0,39 IDT: 0,41	D: 0,21-3,99 IDT: 0,18-5,19
Transportrelaterede faktorer						
Indfangning	Fangerhold_ID	KIK ID for fangerhold, der har indfanget de kyllinger, som er transporteret til slagting fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn, indberettet af slagteriet.	43 fangerhold. 1-1.110 flokke per fangerhold.	-	-	-
	% Vingskader	% vingskader registreret af slagteriet, en stikprøve umiddelbart efter kyllingerne er hængt op. Stikprøvens størrelse varierer mellem slagterierne.				
Vejrforhold	Middeltemperatur	Middeltemperatur (i °C) for et 12 timers tidsinterval, enten kl. 06.00 – 18.00 or 18:00 – 06.00. Gennemsnit af en måling hvert 10. minut	14.515 <-5: 272	8,29	6,30	-13,47-25,80

		på DMI vejrstation Aars Syd. Kategoriseret på to forskellige måder afhængigt af datasættets størrelse: Risikofaktormodeller: <-5: =< -5°C -5-0: >-5°C & =< 0°C 0-15: >0°C & =< 15°C 15-20: >15°C & =< 20°C >20: > 20°C Prædiktionsmodeller: <0: =< 0°C 0-17: >0°C & =< 17°C >17: > 17°C	-5-0: 1.326 0-15: 10.782 15-20: 1.937 >20: 198 <0: 1.598 0-17: 12.002 >17: 915			
	Middel relativ luftfugtighed	Middel relativ luftfugtighed (i %) for et 12 timers tidsinterval, enten kl. 06.00 – 18.00 or 18:00 – 06.00. Gennemsnit af en måling hvert 10. minut på DMI vejrstation Aars Syd.	14.515	86,41	10,02	37,36-100,00
	Middelvindhastighed	Middelvindhastighed (i m/s) for et 12 timers tidsinterval, enten kl. 06.00 – 18.00 eller 18:00 – 06.00. Gennemsnit af en måling hvert 10. minut på DMI vejrstation Aars Syd.	14.515	4,03	2,16	0,29-15,10
	Akkumuleret nedbør	Akkumuleret nedbør (i mm) for et 12 timers tidsinterval, enten kl. 06.00 – 18.00 or 18:00 – 06.00. Gennemsnit af en måling hvert 10. minut på DMI vejrstation Aars Syd.	14.515	1,04	2,43	0,00-33,30
Transport	Lastetæthed	Gennemsnitlig lastetæthed (cm ² /kg) per modul per flok på tværs af alle vognlæs, der transporterer kyllinger til slagtning fra ét hus til Slagteri A i et slagtedøgn. Kun data tilgængeligt fra Slagteri A i perioden 2013-2014. Beregnet som arealet per modul divideret med gennemsnitlig vægt per modul (beregnet som kg transporteret divideret med antal moduler på alle vognlæs). Kategoriseret som: Lav: > 160 cm ² /kg Høj: <= 160 cm ² /kg	Lav: 2.364 Høj: 162	168.8	11,1	142,1-220,0
	Afstand fra besætning til slagteri	Afstand fra besætning til slagteri (i km). CHR nummerets adresse (ejendomsadressen) blev slået op i CHR. Den korteste afstand fra besætning til slagteri målt i Google Maps for hver kombination af CHR og slagteri A, B eller C.	14.515	115	74	8-320
Slagterirelaterede faktorer						
På slagteriet	Ankomsttid til slagteriet	Tidspunkt for ankomst til slagteriet af det 1. læs af en flok, registreret af slagteriet. Dag: 06:01 – 18:00 Aften: 18:01 – 23:59 Nat: 00:00 – 06:00	Dag: 4.648 Aften: 4.449 Nat: 5.418	-	-	-
	Ventetid på slagteriet	Tidsinterval (i minutter) mellem den registrerede ankomsttid til	12.225	182	99	1-1.373

		slagteriet for det 1. vognlæs og det registrerede starttidspunkt for slagtning af flokken, som er transporteret til slagtning fra ét hus på et antal vognlæs til samme slagteri i et slagtedøgn, registreret af slagteriet.				
--	--	---	--	--	--	--

Typer af fejl i tidsintervaller afledt af tidspunkter registreret i KIK

De beregnede tidsintervaller var i 2.677 tilfælde fejlbehæftede (svarende til 15,4 % af datasættet).


	Definition	Hvordan registreret	Beslutning om brug af data
Indfangningens varighed	Interval mellem læsningens start og 1. lastbils afgang fra besætningen.	Registreret manuelt af fangerholdet.	Lav variation tydede på, at der kunne være tale om automatisk registrering for at opnå en varighed af indfangningen på 60 minutter. Derfor blev indfangningens varighed udeladt fra dataanalysen.
Transportens varighed	Interval mellem 1. lastbils afgang fra besætningen og 1. lastbils ankomst til slagteriet	Afgang fra besætningen registreret som ovenfor. Ankomst til slagteriet registreret enten manuelt af vognmand ved indvejning på brovægt eller automatisk ved aflæsning af moduler til venteområde.	På grund af den høje fejlprocent og heraf datatab ved at bruge tidsintervallerne afledt af tidsmarkører i KIK samt muligheden for at bruge data fremadrettet blev afstanden mellem CHR nummer og slagteri valgt som udtryk for transportens varighed i de videre analyser.
Ventetid på slagteriet	Interval mellem 1. lastbils ankomst til slagteriet og slagtetidspunktet	Ankomst som ovenfor. Slagetidspunkt registreret manuelt af slagteformanden.	Slagterierne oplyste, at lange ventetider kan forekomme, når et slagtehold/flok af forskellige årsager må vente fra et skift til det næste. Ventetiden på slagteriet blev benyttet i tilfælde, hvor der ikke var konstateret fejl i slagtetidspunktet.

Antal observationer (n=17.375)	Fejlkategori	Beskrivelse af fejl	Beslutning om editering
8	-2	Ekstremt lang transporttid	Alle tidsvariable blev fjernet
475	-1	En eller flere ulogiske fejl i tidspunkter og/eller -intervaller	Alle tidsvariable blev fjernet
681	0	00:00 i slagtetidspunkt og deraf følgende negativ eller ventetid på slagteriet=0. Resterende tidsvariable virker realistiske	Slagetidspunktet blev fjernet – de resterende tidsvariable blev bibeholdt
14,698	1	Ingen fejl konstateret	
187	2	Negativ ventetid på slagteriet som følge af datofejl i slagtetidspunktet.	Slagetidspunktet blev fjernet – de resterende tidsvariable blev bibeholdt
325	3	Ekstremt lang ventetid/total varighed af kyllingers ophold i transportkasserne (>24 timer)	Slagetidspunktet blev fjernet – de resterende tidsvariable blev bibeholdt
825	4	00:00 i slagtetidspunkt og deraf følgende ventetid på slagteriet > 0. Resterende tidsvariable virker realistiske	Slagetidspunktet blev fjernet – de resterende tidsvariable blev bibeholdt
176	5	Slagtedato matcher ikke de resterende datoer, resulterende i enten negativ eller ekstremt lang total varighed af kyllingers ophold i transportkasserne	Slagetidspunktet blev fjernet – de resterende tidsvariable blev bibeholdt


Fordeling af kassationsårsager indberettet af veterinærkontrollen. Der registreres kun én kassationsårsag per kasseret kylling, uanset at en kylling kan have flere diagnoser samtidigt.

Figur 1. Eksempler på mangelfuld registrering (bugvattersot og ledbetændelse) på tværs af slagterier

% Bugvattersot:




% Ledbetændelse:




Figur 2. Eksempler på forskelle mellem fordeling af kassationsårsager mellem Slagteri A, B og C.

% Rifter:


Slagteri A:



Slagteri B:




Slagteri C:




% Hjertesækkbetændelse:


Slagteri A:



Slagteri B:




Slagteri C:




% Kronisk leverbetændelse:


Slagteri A:



Slagteri B:




Slagteri C:




Fordeling af registrering af hasesvidninger og vingeskader, indberettet af Slagteri A, B og C, x-aksen angiver % hasesvidninger hhv. vingeskader registreret og y-aksen antallet af flokke.

% Hasesvidninger: Der er tegn på kraftig underrapportering på Slagteri A og C.


Slagteri A:



Slagteri B:




Slagteri C:




% Vingeskader: Der er tegn på kraftig underrapportering på Slagteri B.


Slagteri A:




Slagteri B:



Slagteri C:



Boxplot af differencen mellem % beregnet dødelighed og % registreret dødelighed i %-point på y-aksen mellem CHR numre, data på rotationsniveau. En lodret linje på x-aksen repræsenterer et CHR nummer. Hver box angiver differencer, der ligger indenfor 1. og 3. kvartil, mens vandrette linjer for enden af stiplede linjer angiver hhv. minimum og maksimum for rotationer indenfor hvert CHR nummer. Datasættet er sorteret efter medianen for differencen. $n=12.914$.



Statistisk modellering

Data blev analyseret vha. det statistiske analysesoftware R (R, version 3.1.1, Boston, MA, USA) og Microsoft Excel (Microsoft Office Excel 2010, Redmond, WA, USA). De otte datasæt blev analyseret som beskrevet herunder. Alle potentielle forklarende variable blev centreret og skaleret forud for modelleringen. Variable uden et markant datatab¹ blev testet for statistisk sammenhæng med høj DOA-% i univariable generaliserede hierarkiske regressionsmodeller med CHR nummer og hus indenfor CHR nummer som 'random effects'. Korrelationer mellem alle forklarende variable med $p < 0.2$ blev undersøgt (test af korrelation eller visuel inspektion af boxplots). Hvis korrelationen blev vurderet som stærk blev den variabel med den mest signifikante sammenhæng med høj DOA-% og/eller med mest biologisk relevans udvalgt til test i den multivariable model. De multivariable modeller blev bygget vha. 'step-wise forwards selection' baseret på Akaike's Information Criterion (AIC). Da hovedeffekterne var fundet blev alle tovejs interaktioner testet og alle variable, der ikke var en del af den multivariable model, blev testet for konfundering (et eller flere parameterestimer ændrede sig mindst 25-30 %). Der blev ikke konstateret konfundering i modellerne. Signifikansniveauet blev sat til $p < 0,01$ for at undgå overfortolkning af sammenhænge sfa. datasættets størrelse. Hvis der ikke var prædikterede sandsynligheder over 75 % i gruppen af observeret lav DOA-% var vi tilfredse med modellen. Konfidensintervaller (95 %) på parameterestimerne blev simuleret/estimeret vha. 'bootstrapping' (250 simulationer per model). Odds ratio (OR) blev valgt som associationsmål. For at visualisere resultaterne af de endelige modeller, blev de simulerede prædikterede sandsynligheder for høj DOA-% plottet overfor udvalgte forklarende variable med angivelse af konfidensintervaller på den prædikterede sandsynlighed i hele det observerede interval af den forklarende variabel.

De mest reducerede prædiktionsmodeller baseret på AIC og kravet om $p < 0,01$ blev undersøgt for præcisionen i at prædiktere sandsynligheden for høj DOA-% for alle flokke transporteret i 2014 ud fra en model, der var trænet på data fra 2011-2013². De bedste modeller blev udvalgt ud fra visuel inspektion af ROC-kurver. Alle variable, der var med i en eller flere af disse fire modeller, blev indsat i alle fire modeller. Visuel inspektion af ROC-kurver for de fremkomne modeller viste, at præcisionen i prædiktionerne ikke blev forringet ved at tage alle variable med og derfor blev de fuldstændige modeller valgt som endelige. De gennemsnitlige parameterestimer for de endelige modeller trænet på data fra 2011-2013² ligger til grund for de prædikterede sandsynligheder og tilhørende sensitivitet (Se) og specificitet (Sp), der blev brugt til at beregne antallet af fejlklassifikationer i 2014 ved cut-off værdier for den prædikterede sandsynlighed for høj DOA-% mellem 0 og 100 %.

¹ Hvis mere end ca. 25 % af observationerne manglede blev variablen ikke testet i den multivariable model.

² Slagteri A foretog i oktober/november 2012 gennemgribende ændringer af deres produktionsapparat. Derfor kunne modellen for Slagteri A kun trænes på data fra 2013.

Resultater af risikofaktormodellerne for hhv. ikke tidligere delslagtede slagtekyllingeflokke (Tabel 1), delslagtede slagtekyllingeflokke (Tabel 2) og tidligere delslagtede slagtekyllingeflokke (Tabel 3)

Tabel 1. Generaliseret multivariabel hierarkisk regressionsmodel for risiko for høj transportdødelighed (DOA) i konventionelle slagtekyllingeflokke, der ikke tidligere var delslagtede og blev transporteret til Slakteri A¹, B eller C i Danmark i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014. Tabellen inkluderer antal niveauer (n), varians og standardafvigelse for 'random effects' og for 'fixed effects': antal observationer (n), parameterestimer med 95 % konfidensintervaller (KI), odds ratio (OR) med 95 % konfidensintervaller (KI) og OR ved stigning fra 1. kvartil (Q25) til 3. kvartil (Q75) for de kvantitative variable, n=5.113

'Random effects'	n	Varians	Standardafvigelse	
CHR nummer	152	0,21	0,45	
Hus indenfor CHR nummer	346	0,00	0,00	
'Fixed effects'	n	Estimat ² (95% KI)	OR (95% KI)	OR ved stigning fra Q25-Q75 (Q25-Q75)
Konstant		-3,32 (-3,59--3,06)		
Slakteri-relaterede faktorer				
Slakteri	2533	Ref.	1,0	
	1938	1,17 (0,90-1,48)	3,2 (2,5-4,4)***	
	1073	1,24 (0,93-1,62)	3,5 (2,5-5,0)***	
Ventetid på slagteriet, per 60 minutter	5169	0,14 (0,09-0,18)	1,1 (1,1-1,2)**	1,2 (132-221 min)
Transport-relaterede faktorer				
Gns. temperatur > 20°C	80	1,66 (1,05-2,27)	5,3 (2,9-9,7)***	
15-20°C	773	0,58 (0,34-0,83)	1,8 (1,4-2,3)***	
0-15°C	4097	Ref.	1,0	
-5-0°C	497	1,03 (0,76-1,29)	2,8 (2,1-3,6)***	
<= -5°C	97	0,79 (-0,82-1,51)	2,2 (0,4-4,5)	
Afstand fra besætning til slagteri, per 100 km	5544	0,81 (0,64-1,01)	2,2 (1,9-2,7)***	2,7 (60-183 km)
Interaktion mellem gns. temperatur og afstand				
> 20°C og per 100 km	80	-1,35 (-2,27- -0,68)	0,3 (0,1-0,5)**	0,2 (60-183 km)
15-20°C og per 100 km	773	-0,56 (-0,85- -0,25)	0,6 (0,4-0,8)**	0,5 (60-183 km)
0-15°C og per 100 km	4097	Ref.	1,0	
-5-0°C og per 100 km	497	0,19 (-0,19-0,58)	1,2 (0,8-1,8)	1,3 (60-183 km)
<= -5°C og per 100 km	97	1,49 (0,66-3,38)	4,5 (1,9-29,5)*	6,3 (60-183 km)
Middelvindhastighed, per 1 m/s	5544	0,07 (0,03-0,11)	1,1 (1,0-1,1)*	1,2 (2,2-5,2 m/s)
Ankomst af 1. læs kl. 18.01-23.59	1795	0,39 (0,17-0,61)	1,5 (1,2-1,8)**	
kl. 00.00-06.00	2174	Ref.	1,0	
kl. 06.01-18.00	1575	0,10 (-0,13-0,34)	1,1 (0,9-1,4)	
Besætningsrelaterede faktorer				
Forældreflokkens alder, per 10 uger	5544	-0,18 (-0,27- -0,09)	0,8 (0,8-0,9)**	0,7 (32-50 uger)
% døde kyllinger før indfangning (DOD)				
<= 0,05 %	5369	Ref.	1,0	
> 0,05 %	175	1,99 (1,66-2,42)	7,3 (5,3-11,2)***	
% kasserede kyllinger af sygdomsmæssige årsager, per %-point	5476	0,39 (0,27-0,51)	1,5 (1,3-1,7)***	1,2 (0,49-0,90 %)

¹ Slakteri A foretog i oktober/november 2012 gennemgribende ændringer af deres produktionsapparat, hvilket påvirkede såvel lastbiler, modulsystem og venteområdet på slagteriet. Af den grund blev kun data efter denne periode benyttet i modellen.

² Parameterestimerne rapporteret her er gennemsnit og 95% konfidensintervaller fra bootstrapping kun med CHR nummer som random effect, da Hus indenfor CHR nummer ikke bidrager til variansen.

% undermålerkyllinger, per 0,1 %-point	5544	0,26 (0,13-0,38)	1,3 (1,1-1,5)***	1,1 (0,01-0,05 %)
Gns. kropsvægt per døgn, per 1 g/døgn	5543	0,05 (0,02-0,08)	1,1 (1,0-1,1)*	1,2 (58-62 g/døgn)
*** p < 0,0001, ** p < 0,001, * p < 0,01				

Tabel 2. Generaliseret multivariabel hierarkisk regressionsmodel for risiko for høj transportdødelighed (DOA) i delslagtede konventionelle slagtekyllingeflokke, som blev transporteret til Slagteri B eller C i Danmark i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014. Tabellen inkluderer antal niveauer (n), varians og standardafvigelse for 'random effects' og for 'fixed effects': antal observationer (n), parameterestimer med 95 % konfidensintervaller (KI), odds ratio (OR) med 95 % konfidensintervaller (KI) og OR ved stigning fra 1. kvartil (Q25) til 3. kvartil (Q75) for de kvantitative variable, n=2.475

'Random effects'		n	Varians	Standardafvigelse	
CHR nummer		80	0,00	0,00	
Hus indenfor CHR nummer		187	0,06	0,25	
'Fixed effects'		n	Estimat (95 % KI) ³	OR (95 % KI)	OR ved stigning fra Q25-Q75 (Q25-Q75)
Konstant			-2,04 (-2,29- -1,80)		
Slagteri-relaterede faktorer					
Ventetid på slagteriet, per 60 minutter		2589	0,13 (0,08-0,17)	1,1 (1,1-1,2) ***	1,3 (100-208 min)
Transport-relaterede faktorer					
Gns. temperatur	> 20°C	31	1,37 (0,24-2,17)	3,9 (1,3-8,7)*	
	15-20°C	392	0,39 (0,10-0,69)	1,5 (1,1-2,0)'	
	0-15°C	2013	Ref.	1,0	
	-5-0°C	266	0,41 (0,05-0,72)	1,5 (1,1-2,1)'	
	<= -5°C	43	0,58 (-0,64-1,66)	1,8 (0,5-5,2)	
Afstand fra besætning til slagteri, per 100 km		2745	0,32 (0,10-0,52)	1,4 (1,1-1,7)*	1,3 (40-115 km)
Besætningsrelaterede faktorer					
Vaccination mod IB					
Nej		835	Ref.	1,0	
Ja		1910	0,46 (0,19-0,72)	1,6 (1,2-2,1)**	
% døde kyllinger i produktionsperioden, per %-point		2743	0,17 (0,07-0,27)	1,2 (1,1-1,3)**	1,2 (1,59-2,50 %)
% døde kyllinger før indfangning (DOD)					
<= 0,05 %		2560	Ref.	1,0	
> 0,05 %		185	1,65 (1,23-2,05)	5,2 (3,4-7,8)***	
% kasserede kyllinger af sygdomsmæssige årsager, per %-point		2627	0,34 (0,19-0,54)	1,4 (1,2-1,7)**	1,2 (0,41-0,88 %)
% undermålerkyllinger, per 0,1 %-point		2745	0,24 (0,14-0,36)	1,3 (1,2-1,4)***	1,1 (0,01-0,06 %)
*** p < 0,0001, ** p < 0,001, * p < 0,01, ' p < 0,05					

³ Parameterestimerne rapporteret her er gennemsnit og 95 % konfidensintervaller fra bootstrapping kun med Hus indenfor CHR nummer som random effect, da CHR nummer ikke bidrager til variansen.

Tabel 3. Generaliseret multivariabel hierarkisk regressionsmodel for risiko for høj transportdødelighed (DOA) i tidligere delslagtede konventionelle slagtekyllingeflokke, som blev transporteret til Slakteri B eller C i Danmark i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014. Tabellen inkluderer antal niveauer (n), varians og standardafvigelse for 'random effects' og for 'fixed effects': antal observationer (n), parameterestimer med 95 % konfidensintervaller (KI), odds ratio (OR) med 95 % konfidensintervaller (KI) og OR ved stigning fra 1. kvartil (Q25) til 3. kvartil (Q75) for de kvantitative variable, n=2.148

'Random effects'		n	Varians	Standardafvigelse	
CHR nummer		82	0,29	0,54	
Hus indenfor CHR nummer		188	0,00	0,00	
'Fixed effects'		n	Estimat (95 % KI)⁴	OR (95 % KI)	OR ved stigning fra Q25-Q75 (Q25-Q75)
Konstant			-1,89 (-2,14- -1,62)		
Slakteri-relaterede faktorer					
Slakteri		1319	Ref.	1,0	
		1367	0,45 (0,18-0,71)	1,6 (1,2-2,0)**	
Ventetid på slagteriet, per 60 minutter		2424	0,16 (0,11-0,23)	1,2 (1,1-1,3)***	1,3 (121-226 min)
Transport-relaterede faktorer					
Gns. temperatur > 20°C		49	1,04 (0,17-1,66)	2,8 (1,2-5,3)*	
15-20°C		356	0,29 (-0,02-0,59)	1,3 (1,0-1,8)	
0-15°C		1966	Ref.	1,0	
-5-0°C		259	0,57 (0,19-0,90)	1,8 (1,2-2,5)*	
<= -5°C		56	1,08 (0,36-1,70)	3,0 (1,4-5,5)*	
Afstand fra besætning til slagteri, per 100 km		2686	0,46 (0,22-0,69)	1,6 (1,2-2,0)***	1,5 (34-125 km)
Besætningsrelaterede faktorer					
Ratio mellem % selvdøde og % aflivede kyllinger i produktionsperioden					
>1,25		2341	Ref.	1,0	
<=1,25		142	-1,02 (-1,82- -0,39)	0,4 (0,2-0,7)*	
Gns. kropsvægt per døgn, per 1 g/døgn		2685	0,06 (0,03-0,10)	1,1 (1,0-1,1)*	1,3 (57-62 g/døgn)
% døde kyllinger før indfangning (DOD)					
<= 0,05 %		2536	Ref.	1,0	
> 0,05 %		150	1,40 (1,01-1,84)	4,0 (2,8-6,3)***	
% kasserede kyllinger af sygdomsmæssige årsager, per %-point		2553	0,39 (0,24-0,58)	1,5 (1,3-1,8)***	1,2 (0,51-0,99 %)

*** p <0,0001, ** p<0,001, * p<0,01

⁴ Parameterestimerne rapporteret her er gennemsnit og 95 % konfidensintervaller fra bootstrapping kun med CHR nummer som random effect, da Hus indenfor CHR nummer ikke bidrager til variansen.

Tabel 4. Generaliseret multivariabel hierarkisk regressionsmodel for risiko for høj transportdødelighed (DOA) i ikke-delslagtede konventionelle slagtekyllingeflokke, som blev transporteret til Slagteri A i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014. Tabellen inkluderer antal niveauer (n), varians og standardafvigelse for 'random effects' og for 'fixed effects': antal observationer (n), parameterestimer med 95 % konfidensintervaller (KI), odds ratio (OR) med 95 % konfidensintervaller (KI) og OR ved stigning fra 1. kvartil (Q25) til 3. kvartil (Q75) for de kvantitative variable, n=2.533

'Random effects'		n	Varians	Standardafvigelse	
CHR nummer		75	0,47	0,69	
Hus indenfor CHR nummer		169	0,00	0,00	
'Fixed effects'		n	Estimat (95 % KI)	OR (95 % KI)	OR ved stigning fra Q25-Q75 (Q25-Q75)
Konstant			-3,43 (-3,79- -3,09)		
Slagteri-relaterede faktorer					
Ventetid på slagteriet, per 60 minutter		2347	0,17 (0,04 -0,27)	1,2 (1,0 - 1,3)*	1,3 (140-225 min)
Transport-relaterede faktorer					
Gns. temperatur og lastetæthed:					
> 20°C uanset lastetæthed		34	1,99 (0,67-2,95)	7,3 (2,0-19,0)**	
15-20°C uanset lastetæthed		363	0,24 (-0,25-0,75)	1,3 (0,8-2,1)	
0-15°C og > 160 cm ² /kg		1760	Ref.	1,0	
0-15°C og <= 160 cm ² /kg		102	1,05 (0,32-1,68)	2,9 (1,4-5,4)**	
<= 0°C uanset lastetæthed		267	1,41 (0,97-1,78)	4,1 (2,6-5,9)***	
Ankomst af 1. læs kl. 18.01-23.59		885	0,57 (0,16-0,97)	1,8 (1,2-2,6)*	
kl. 00.00-06.00		991	Ref.	1,0	
kl. 06.01-18.00		657	-0,15 (-0,65-0,27)	0,9 (0,5-1,3)	
Afstand fra besætning til slagteri, per 100 km		2533	0,81 (0,49-1,21)	2,3 (1,6-3,4)***	2,4 (93-201 km)
Middelvindhastighed, per 1 m/s		2533	0,17 (0,11-0,24)	1,2 (1,1-1,3)***	1,6 (2,2-5,1 m/s)
Besætningsrelaterede faktorer					
% kasserede kyllinger af sygdomsmæssige årsager, per %-point		2533	0,56 (0,30 - 0,91)	1,8 (1,4 - 2,5)***	1,2 (0,48-0,88 %)
Slagtealder <= 37 dage		2241	Ref.	1,0	
> 37 dage		292	0,98 (0,49 - 1,38)	2,7 (1,6 - 4,0)***	
*** p <0.0001, ** p<0.001, * p<0.01					

*** p < 0,0001, ** p < 0,001, * p < 0,01

Resultater af prædiktionsmodellerne

Tabel 1. Fire slagteri- og slagtegruppespecifikke generaliserede multivariable hierarkiske regressionsmodeller for risiko for høj transportdødelighed (DOA) i konventionelle slagtekyllingeflokke, som blev transporteret til Slagteri A eller B i Danmark i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014. Tabellen inkluderer per model: antal observationer, varians og standardafvigelse (std.afv.) i parentes for random effects, parameterestimer og standard error (SE) i parentes for fixed effects


Slagteri	A	B	B	B
Slagtegruppe	Ikke-delslagtede flokke ¹	Ikke-delslagtede flokke ²	Delslagtede flokke	Tidligere delslagtede flokke
Antal observationer	2.533	1.613	1.466	1.160
'Random effects'	Varians (std.afv.)	Varians (std.afv.)	Varians (std.afv.)	Varians (std.afv.)
CHR nummer	0,318 (0,564)	0,043 (0,208)	0,048 (0,219)	0,141 (0,376)
Hus indenfor CHR nummer	0,000	0,000	0,098 (0,313)	0,000
'Fixed effects'	Estimat (SE)	Estimat (SE)	Estimat (SE)	Estimat (SE)
Konstant	-3,021 (0,168)***	-2,196 (0,147)***	-1,755 (0,125)***	-2,081 (0,174)***
Gns. temperatur > 17°C	1,105 (0,296)***	1,081 (0,258)***	0,251 (0,337)	0,750 (0,288)**
0-17°C	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
<= 0°C	1,233(0,191)***	0,440 (0,228)	0,769 (0,201)***	0,547 (0,263)*
Middelvindhastighed, m/s	0,172 (0,032)***	-0,003 (0,034)	0,056 (0,032)	0,006 (0,038)
Afstand fra besætning til slagteri, per 100 km	0,734 (0,174)***	0,400 (0,141)**	0,451 (0,161)**	-0,043 (0,183)
Interaktion mellem gns. temperatur og afstand				
> 17 °C og per 100 km	0,051 (0,403)	-1,228 (0,435)**	-1,589 (0,736)*	0,717 (0,490)
0-17 °C og per 100 km	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
<= 0 °C og per 100 km	-0,059 (0,289)	0,602 (0,331)	-0,183 (0,401)	0,692 (0,461)
Ankomst af 1. læs	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
kl. 00.00-06.00	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
kl. 06.01-18.00	-0,245 (0,202)	0,353 (0,208)	0,192 (0,177)	0,590 (0,220)**
kl. 18.01-23.59	0,416 (0,169)*	0,509 (0,171)**	0,226 (0,176)	0,445 (0,204)*
Gns. DOA-% for de tre seneste flokke fra samme hus indenfor CHR nummer ³	1,019 (-0,468)*	1,044 (0,553)	0,381 (0,287)	1,879 (0,543)***

*** p <0,001, ** p<0,01, * p<0,05


¹ Kun data fra 2013 og 2014, da Slagteri A udskiftede lastbiler, modulsystem, kasser og venteområde på slagteriet i oktober/november 2012. Derfor ansås det ikke som meningsfyldt at bruge data fra tidligere til at prædikere høj DOA-% i 2014.

² Observationer fra flokke leveret til fem CHR-numre med markant anderledes sammenhæng mellem DOA-% og en række forklarende variable blev udeladt af datasættet til analyse, n=217.


³ For delslagtede flokke: de seneste tre delslagtede flokke opdrættet i samme hus indenfor CHR nummer og for ikke-delslagtede og tidligere delslagtede flokke: de seneste tre enten ikke-delslagtede eller tidligere delslagtede flokke opdrættet i samme hus indenfor CHR nummer.



Figur 1. Sammenhængen mellem model-prædikeret sandsynlighed for høj DOA-% ved tre gennemsnitlige temperaturintervaller og den korteste afstand fra besætningen til slagteriet (km) for delslagtede slagtekyllingeflokke transporteret til Slagteri B i perioden 2011-2014. Punkter med lodrette linjer angiver gennemsnitlige prædikerede sandsynligheder med 95 % konfidensinterval aflæst på y-aksen for afstanden i km aflæst på x-aksen. Middelvindhastighed og gennemsnitlig DOA-% for de tre seneste flokke transporteret fra samme hus indenfor CHR nummer er sat til gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 00.00-06.00.




Figur 2. Sammenhængen mellem model-prædikeret sandsynlighed for høj DOA-% ved tre gennemsnitlige temperaturintervaller og den korteste afstand fra besætningen til slagteriet (km) for tidligere delslagtede slagtekyllingeflokke transporteret til Slagteri B i perioden 2011-2014. Punkter med lodrette linjer angiver gennemsnitlige prædikerede sandsynligheder med 95 % konfidensinterval aflæst på y-aksen for afstanden i km aflæst på x-aksen. Middelvind og gennemsnitlig DOA-% for de tre seneste flokke transporteret fra samme hus indenfor CHR nummer er sat til gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 00.00-06.00.




Figur 3. Sammenhængen mellem model-prædikeret sandsynlighed for høj DOA-% ved tre gennemsnitlige temperaturintervaller og den korteste afstand fra besætningen til slagteriet (km) for ikke-delslagtede slagtekyllingeflokke transporteret til Slagteri B i perioden 2011-2014. Punkter med lodrette linjer angiver gennemsnitlige prædikerede sandsynligheder med 95 % konfidensinterval aflæst på y-aksen for afstanden i km aflæst på x-aksen. Middelvind og gennemsnitlig DOA-% for de tre seneste flokke transporteret fra samme hus indenfor CHR nummer er sat til gennemsnittet, mens ankomst af 1. læs er sat til kl. 00.00-06.00.

Eksempler på præcision i forudsigelse af flokke, som ville få høj DOA-%, på Slagteri A i 2014.


Scenarie 1. Grænseværdi på 25 % sandsynlighed for høj DOA-%. Samlet fejlklassifikationsprocent: **8,4 %**




Scenarie 2. Grænseværdi på 5 % sandsynlighed for høj DOA-%. Samlet fejlklassifikationsprocent: **48,2 %**




Deskriptive plots af sammenhængen mellem andel af flokke med høj DOA-% og gennemsnitlig temperatur



Figur 1. Sammenhængen mellem andelen af flokke med høj DOA-% og gennemsnitlig temperatur under transporten af ikke-delslagtede flokke til Slagteri A, B eller C i perioden 2011-2014. Hvert punkt repræsenterer ca. 150 observationer.



Figur 2. Sammenhængen mellem andelen af flokke med høj DOA-% og gennemsnitlig temperatur under transporten af tidligere delslagtede flokke til Slagteri B eller C i perioden 2011-2014. Hvert punkt repræsenterer ca. 70 observationer.



Figur 3. Sammenhængen mellem andelen af flokke med høj DOA-% og gennemsnitlig temperatur under transporten af delslagtede flokke til Slagteri B eller C i perioden 2011-2014. Hvert punkt repræsenterer ca. 70 observationer.

Delprojekt 2: Transportegnethed hos malkekøer

Kirstin Dahl-Pedersen, Hans Houe, Mette S. Herskin og Peter T. Thomsen

Dansk resume

Årligt transporteres ca. 200.000 malkekøer til slagtning i Danmark. Disse dyr udgør en særligt udsat dyregruppe i forhold til transport, idet de typisk er belastede som følge af gentagne drægtigheder, kælvninger og laktationer. Udsætterkøer kan have forskellige sygdomme, skader eller svækkelser, der kan gøre transporten mere belastende end for yngre slagtedyr. En forkert vurdering af en kørs transportegnethed kan have store dyrevelfærdsmæssige konsekvenser for den enkelte ko, men også juridiske og økonomiske konsekvenser for såvel landmand, chauffør som vognmand. I lyset af ovenstående er det iøjnefaldende at der til dato ikke findes undersøgelser – hverken nationalt eller internationalt – som har fokuseret på belastning forbundet med transport af netop disse dyr, eller på dyrenes egnethed til transport.

Formålet med Delprojekt 2 var derfor, med udgangspunkt i transporter af udsætterkøer fra besætning til slagteri afviklet under kommercielle, danske forhold, at: 1) kvantificere ændringer i relevante mål for belastning og transportegnethed hos malkekøer efter transport til slagteri (med en varighed på under 8 timer) for at besvare spørgsmålet: Kan transport af disse køer føre til en forværring af deres tilstand?; 2) identificere risikofaktorer (knyttet til såvel køen som transporten) for forværring af køernes tilstand i løbet af transporten. Om muligt skulle projektets resultater omsættes til et værktøj til at udpege køer, som er uegnede til transport før afgang fra besætningen.

Projektet var et observationelt studie involverende 411 udsatte malkekøer, der blev transporteret til slagtning i perioden januar 2015 – januar 2016. Køerne blev undersøgt i besætningen inden læsning og herefter læsset, transporteret og aflæsset på Danish Crowns kreaturslagteri i Holsted. På slagteriet gennemgik køerne det rutinemæssige levende syn og blev slagtet efter at have gennemgået endnu en klinisk undersøgelse. Landmanden udpegede selv køerne til slagtning i henhold til sine normale rutiner ligesom læsning, transport og aflæsning også forløb som normalt. Transportens distance og varighed samt varighed af pauser under kørslen blev registreret. I projektet indgik ét slagteri, fire vognmandsfirmaer og 20 danske malkekvægsbesætninger. Alle kliniske undersøgelser i besætningerne og på slagteriet blev udført af den samme dyrlæge.

Køerne blev udsat efter gennemsnitligt 2,9 laktationer (1-10) og gennemsnitligt 270 dage efter kælvning (15-871 dage). Hovedparten, 63,2 %, var i normalt huld over 2,5 og under 4,0; 15,8 % var magre (huld $\leq 2,5$) og 21 % var fede (huld $\geq 4,0$). Tredive procent af køerne havde hasetrykninger, mens ældre, ophelede halefrakturer blev fundet hos 5,6 % af køerne.

Dataindsamlingen fordelte sig på 49 ture med 3-20 køer pr. tur (gennemsnit: 8,5). Den gennemsnitlige kørte distance på turene var 129 km (20-339 km). Turene varede i gennemsnit 187 min. (32-510 min.). I gennemsnit var der 2 pauser pr. tur (0-6), og den gennemsnitlige samlede varighed af pauser var 48 min.

Ud af de 411 køer ankom kun 9 til slagteriet i en tilstand, som ville have udløst en bedømmelse som uegnet til transport jf. dansk praksis. Disse var alle svært halte ved ankomsten (halthedsscore 5). Det lave antal af køer, som blev uegnede til transport undervejs betyder, at projektets resultater ikke kan omsættes til et værktøj til at udpege uegnede køer før afgang fra besætningen.

Tre kliniske mål viste sig interessante i forhold til at vurdere om det er en belastning for køer at blive transporteret, idet der her var tale om en signifikant forværring efter transport: Halthed, mælkeløb og forekomst af sår. Samlet set blev 19 % af køerne halte eller mere halte i løbet af transporten.

Der var ingen sammenhæng mellem de undersøgte karakteristika ved transporten (varighed, distance eller antal pauser undervejs) og udvikling/forværring af halthed under transporten. Resultaterne viste dog en signifikant sammenhæng mellem risikoen for at ankomme halt eller mere halt til slagteriet og lav huldscore, tidlig eller sen laktation, kliniske tegn på digital dermatitis på bagbenene, samt tilstedeværelsen af et skævt bækken. Køer i lavt huld, køer tidligt eller sent i laktationen (sammenlignet med midt i laktationen), køer med digital dermatitis samt køer med skævt bækken havde således en signifikant højere risiko for at blive halte eller mere halte i løbet af transporten. Der var endvidere signifikant sammenhæng mellem forværring af mælkeløb efter transporten og laktationsstadium samt transportens distance. Således havde køer tidligt i laktationen signifikant højere risiko for forværring sammenlignet med køer senere i laktationen. Køer, der blev transporteret langt, havde ligeledes højere risiko for forværring af mælkeløb. Før transport havde 22,4 % af køerne sår. Alle var skorpebeklædt og dermed under opheling. Efter transport havde 33,8 % af køerne sår (ved inklusion af både gamle og nye). Før transport var sårene på benene primært placeret på haserne (66,3 % af alle sår på ben), efter transport primært på koderne (64,6 % af alle sår på ben). Sårene på kroppen var før transport primært placeret på lårene (55,7 % af alle sår på krop), efter transport primært på hoftehjørner og sædeben (40 % af alle sår på krop). Mindst 12 køer vurderes ud fra deres tilsøling og eventuelle sår til at have været nede at ligge undervejs. Analyserne viste ingen sammenhæng mellem stigningen i forekomsten af sår og de forklarende variable, som indgik i undersøgelsen.

Dette projekt er det første af sin art på verdensplan og har genereret ny viden om risikoen for forværring af dyrenes kliniske tilstand, og dermed for graden af belastning og transportegnethed hos malkekøer efter transport til slagteri (med en transportvarighed på under 8 timer). Resultaterne danner grundlag for anbefalinger eller retningslinier for transport af malkekøer, som allerede på kort sigt vil kunne implementeres i praksis og være til gavn for såvel dyrenes velfærd som branchens arbejdsvilkår samt myndighedernes mulighed for kontrol.

Summary

Each year, approximately 200,000 dairy cows are transported to slaughter in Denmark. These animals are more vulnerable to transport stress than younger livestock sent to slaughter, due to repeated pregnancies, calvings and lactations. Cull dairy cows may be characterised by diseases, injuries or weaknesses, which may increase the severity of transport as a stressor. However, to date no scientific studies – nationally or internationally – have focused on the consequences of transport or the pre-transport fitness for transport for this specific group of animals.

The aims of this project were, based on transport of cull dairy cows from commercial farms to slaughter in Denmark – to 1) quantify changes in relevant clinical measures of fitness for transport as well as the

severity of transport stress after transport to slaughter (duration up to 8 hours) in order to answer the question: Does transport of cull cows lead to a worsening of their clinical condition?; and 2) to identify risk factors (associated with the cow as well as the transport) for a potential worsening of the clinical condition of the cows during transport. If possible, these results were to be formulated into a tool to be used by farmers and livestock drivers in order to be able to perform a pre-transport assessment of fitness for transport.

The project consisted of an observational study involving 411 cull dairy cows, transported to slaughter between January 2015 and January 2016. The cows were examined clinically on-farm before loading, and then transported to Danish Crown's slaughterhouse in Holsted, Denmark. At the slaughterhouse, the cows passed the routine veterinary inspection and were slaughtered after a second clinical examination. Cows to be included in the study were selected by the owner, and all management on the day of slaughter followed the normal, commercial procedures. The study included commercial transport trucks from four driving companies and cows from 20 commercial dairy herds.

Data were collected from 49 trips with a mean of 8.5 cows per trip. The mean transport distance was 129 km and the mean transport duration was 187 min. The mean number of pauses per trip was 2 with a mean total duration of 48 min. The cows were culled after a mean of 2.9 lactations and a mean of 270 days after calving. The majority of the cows (63.2 %) were in normal body condition, 15.8 % were thin (body condition score ≤ 2.5) and 21 % were fat (body condition score ≥ 4.0). Thirty percent of the cows had hock lesions, and older, healed tail fractures were found on 5.6 % of the cows.

Only 9 cows arrived at the slaughterhouse in a clinical condition, which would have been considered unfit for transport according to current Danish practice. These were all severely lame (lameness score 5). This low number of animals being unfit for transport upon arrival, meant that the results could not be used to formulate a tool for the pre-transport assessment of fitness for transport. However, three clinical measures turned out to be interesting in terms of evaluating the worsening of the clinical condition of cull dairy cows after transport: lameness score (19% of the cows became lame or more lame after transport), milk leakage and skin lesions.

No associations were found between the examined transport characteristics (duration, distance and number of pauses) and the changes in lameness during transport. However, the risk of arriving at the slaughterhouse with an increased lameness score was significantly higher for cows with low body condition score, cows in early or late lactation (compared to mid lactation), cows with digital dermatitis on the hind feet as well as cows with a lopsided pelvis. In addition, cows in early lactation as well as cows transported a longer distance had a significantly increased risk of milk leakage.

Before transport, 22.4 % of the cows had skin lesions, all crusted and in a phase of healing. After transport, skin lesions were found on 33.8 % of the cows. No significant associations were found between the examined explanatory variables and the increased occurrence of skin lesions after transport. Based on their degree of dirtiness and the occurrence of skin lesions, at least 12 cows were expected to have been down during transport.

Worldwide, this project is the largest to date, and has generated important new knowledge about the changes in the clinical condition of cull dairy cows after transport to slaughter, and hence about the negative consequences of transport of these animals under Danish conditions (up to 8 hours). The

results provide strong support for future recommendations and guidelines – to be implemented in a relatively short time span - for transport of cull cows. Such recommendations would benefit the welfare of cull cows during transport, and be able to provide support to the dairy industry, the animal transport industry as well as the controlling authorities.

Baggrund

Årligt transporteres ca. 200.000 malkekøer til slagtning i Danmark (Anonym, 2016). Modsat udsættersøer, som for en vis del slagtes i udlandet, slagtes langt de fleste udsætterkøer på danske slagterier. I Danmark findes tre store kreaturslagterier: Aarhus Slagtehus (1.400 slagtninger/uge), Danish Crown Aalborg (2.400 slagtninger/uge) og Danish Crown Holsted (4.500 slagtninger/uge) samt et antal mindre slagtehuse. De fleste malkekvægsbesætninger ligger i Jylland og dermed er der i reglen relativt kort afstand til et slagteri. Danish Crown oplyser, at den gennemsnitlige afstand fra besætning til slagteriet i enten Holsted eller Aalborg er ca. 70 km (Carlsen, 2016).

Malkekøer, der er udvalgt til udsætning, udgør en særligt udsat dyregruppe i forhold til transport på grund af deres alder og stadiet i produktionscyklus – udsætterkøer har typisk gennemlevet gentagne drægtigheder, kælvninger og laktationer. Udsætterkøer kan derudover have forskellige sygdomme, skader eller svækkelser, der kan gøre transporten mere belastende end for yngre slagtedyr (Nielsen et al., 2011; OIE, 2016).

En forkert vurdering af et dyrs transportegnethed kan have store dyrevelfærdsmæssige konsekvenser for det enkelte dyr, men også juridiske og økonomiske konsekvenser for såvel landmand, chauffør som vognmand. I lyset af ovenstående er det derfor iøjnefaldende at der til dato ikke findes undersøgelser – hverken nationalt eller internationalt – der har fokuseret på belastning forbundet med transport af netop disse dyr, eller på dyrenes egnethed til transport.

Formål

Formålet med Delprojekt 2 var derfor, med udgangspunkt i kommercielle transporter af udsætterkøer fra besætning til slagteri, at:

- 1) kvantificere ændringer i relevante mål for belastning og transportegnethed hos malkekøer efter transport til slagteri (med en varighed på under 8 timer) for at besvare spørgsmålet: Kan transport af disse køer føre til en forværring af deres kliniske tilstand?
- 2) identificere risikofaktorer (knyttet til såvel koen som transporten) for forværring af køernes tilstand i løbet af transporten.

Om muligt skulle projektets resultater omsættes til et værktøj, som før selve transporten, kunne anvendes til at udpege køer, som var uegnede til transport.

Materialer og metoder

Projektets forløb

Projektet er, som planlagt, forløbet med en dataindsamlingsperiode fra januar 2015- januar 2016. For at muliggøre inklusion og transport af måske transportegnede køer blev der indhentet en dyreforsøgstilladelse (Journalnr.: 2015-15-0201-00716), som fritog vognmænd, chauffører og landmænd for det juridiske ansvar for dyrenes transportegnethed. Dette ansvar placeredes i stedet på tilladelsesholderen, projektets dyrlæge, som således var ansvarlig for at køerne på afgangstidspunktet ikke var uegnede til transport. Beslutningen om egnetheden blev truffet på grundlag af den kliniske undersøgelse i besætningen og tilladelsen muliggjorde, at kun køer, som ved denne undersøgelse blev fundet entydigt uegnede jf. Transportforordningen (EU 1/2005), ikke kunne medtages i projektet. Rigspolitiet blev før projektets start orienteret om forsøget og modtog en kopi af tilladelsen.

På trods af dyreforsøgstilladelsen var dataindsamlingen imidlertid ikke uden juridiske udfordringer. Baggrunden herfor var at dyreforsøgslovgivningen overvejende retter sig mod forsøg gennemført under eksperimentelle rammer. Når man, som tilfældet var her, bringer forskningsprojekter, der kræver dyreforsøgstilladelse, ud under kommercielle forhold, er der risiko for, at Dyreforsøgslovgivningen kolliderer med anden lovgivning på området. I nærværende projekt krævede teksten i tilladelsen flere justeringer og præciseringer undervejs for at nå frem til en formulering, der gav mulighed for, indenfor tilladelsens rammer, at gennemføre projektet uden at gøre sig skyldig i overtrædelse af andre love, særligt Dyreværnsloven (LBK nr 1019 af 29/06/2016) og Transportforordningen (EU 1/2005). I sidste ende måtte juridiske myndigheder fastslå at man i dette tilfælde kunne gøre brug af lex specialis-princippet. Lex specialis er et retsanvendelsesprincip, der muliggør at ”en lov, der angår en speciel situation, går forud for en generel lov vedrørende samme område; den specielle bestemmelse inden for en lov går ligeledes forud for den generelt udformede regel inden for samme lov” (Dalberg-Larsen og Nielsen, 2016). I fremtidige lignende forsøg vil det være fordelagtigt tidligt at være opmærksom på sådanne udfordringer.

Undervejs i projektperioden har planer for, status og delresultater fra Delprojekt 2 været præsenteret ved danske såvel som internationale møder/kongresser. Liste herover fremgår af Bilag 3.

Projektdesign

Projektet var et observationelt studie involverende 411 malkekøer, som var besluttet udsat, og blev transporteret til slagtning i dataindsamlingsperioden. Køerne gennemgik en grundig klinisk undersøgelse i besætningen inden læsning og blev herefter læsset, transporteret og aflæsset på Danish Crowns kreaturslagteri i Holsted. På slagteriet gennemgik køerne det rutinemæssige levende syn og blev slagtet efter at have gennemgået endnu en klinisk undersøgelse. De deltagende landmænd udpegede selv køerne til slagtning i henhold til besætningens normale rutiner ligesom også læsning, transport og aflæsning forløb som normalt. Transportens distance og varighed samt varighed af pauser under kørslen blev registreret. I projektet indgik ét slagteri, fire vognmandsfirmaer og 20 malkekvægsbesætninger. Alle kliniske undersøgelser i besætningerne og på slagteriet blev udført af den samme dyrlæge.

Udvælgelse af deltagende besætninger

Deltagerne blev udvalgt ved en såkaldt convenience sampling (Houe et al., 2004) ud fra, hvad der mest praktisk lod sig gøre. Slagteriet, Danish Crown Holsted, blev valgt på grund af størrelse og beliggenhed. Transportorganisationerne DTL og ITD var herefter behjælpelige med at skaffe kontakt til i alt fire

vognmandsfirmaer, der indtransporterede malkekøer til Danish Crown Holsted. Det var i forbindelse med valget af vognmænd væsentligt, at de opererede i forskellige geografiske områder, således at der kunne inkluderes transporter af varierende distance og varighed. Alle landmænd med malkekøer på vognmændenes leverandørliste blev kontaktet pr. brev og orienteret om projektet. Herefter blev listerne sorteret i tilfældig rækkefølge og - startende fra toppen af listen - landmændene én for én kontaktet pr. telefon og inviteret til at deltage, indtil det ønskede deltagerantal på 25 var nået. Et deltagerantal på 25 var begrundet med dels at kunne inkludere besætninger nok til, at der i løbet af et år kunne indsamles data fra et tilstrækkeligt antal dyr (målsætning ca. 500) og dels ikke at inkludere flere besætninger, end det logistisk var muligt at håndtere. Oprindeligt indvilligede 25 landmænd i at deltage, men af forskellige årsager, herunder salg af bedrift, endte projektet med 20 deltagende landmænd. Alle vognmænd, chauffører og landmænd blev lovet fuld anonymitet.

Udvælgelse af dyr

De deltagende landmænd udpegede selv deres køer til slagtning. Følgende kriterier skulle opfyldes for at en ko kunne inkluderes i projektet: Ko (ikke kvie), malkerace, ikke i sidste tiendedel af drægtighed (pga. Transportforordningen, EU 1/2005), ikke bindestalde (pga. af vanskelighed ved halthedsvurdering), egnet eller måske egnet til transport. Der var ingen krav i forhold til alder, laktationsstadium eller udsætningsårsag og køer fra både konventionelle og økologiske besætninger blev medtaget. Eksklusionskriterierne var derfor: Kvie, kødkvægsrace, drægtig i sidste tiendedel af drægtighed, bindestald, uegnet til transport jf. Transportforordningen (EU 1/2005).

De deltagende landmænd meldte køer til slagtning direkte hos slagteriet, og projektdyrlægen afgjorde derefter i samråd med enten landmand eller vognmand, om transporten kunne gennemføres i regi af den overordnede logistiske plan for projektet. I tilfælde hvor køerne skulle afhentes om morgenen eller formiddagen, blev de undersøgt samme morgen. I tilfælde hvor de skulle afhentes om natten, blev de undersøgt aftenen forinden. Intervallet mellem den kliniske undersøgelse og afhentning kunne derfor være op til 8 timer.

Klinisk undersøgelse i besætningen

Den kliniske undersøgelse i besætningen inkluderede blandt andet vurdering af almenbefindende, kropstemperatur, puls og respirationsfrekvens, huldvurdering, inspektion og palpation af hud, hårlag, lemmer, krop og yver (herunder mælkeløb), vurdering af perifert og centralt kredsløb herunder auskultation af hjerte, vurdering af respiration herunder auskultation af lunger samt halthedsvurdering (Bilag 1). Køerne var fikseret i fanggitter under undersøgelsen, men blev sluppet fri i forbindelse med halthedsvurdering. Til halthedsvurdering anvendtes en skala fra 1 til 5, hvor 1 er en normalt gående ko og 5 en svært halt ko (Thomsen et al., 2008). Til huldvurderingen anvendtes en skala fra 1 til 5 med kvarte karakterer, hvor 1 er en stærkt afmagret ko og 5 en svært overvægtig ko (Ferguson et al., 1994). Den kliniske undersøgelse af hver ko varede ca. 15 min. I forbindelse med den kliniske undersøgelse oplyste landmanden med egne ord den primære udsætningsårsag for hver af de involverede køer.

Efter den kliniske undersøgelse udfærdigede dyrlægen en attest med CKR-numre på de køer, der ikke var fundet uegnede til transport og derfor kunne indgå i projektet. Chaufføren medbragte denne attest samt en kopi af dyreforsøgstilladelsen i lastbilen. Begge dele ville kunne fremvises som dokumentation ved en eventuel vejkontrol. Alle køer blev transporteret til slagteri med den vognmand og det transportkøretøj, som til daglig var knyttet til den pågældende besætning.

Registreringer under transporten

Efter pålæsning fulgte dyrlægen transporten til slagteriet ved at køre bagved den kommercielle transportvogn. Turen gik som oftest via et antal andre besætninger for at fylde lastbilen op, idet udsætterkøer sjældent sendes af sted i stort antal fra én besætning. Den omstændighed at chaufførerne besøgte flere besætninger undervejs og flyttede rundt på såvel køerne (f.eks. fra kærre til forvogn eller omvendt), som på skillerum, efterhånden som flere dyr blev læsset på bilen, betød at det i praksis var umuligt at registrere lastetætheden nøjagtigt. Derfor blev det alene konstateret, at alle chauffører benyttede skillerum. Kun i de få tilfælde, hvor der var tale om skånetransport, blev dette registreret separat. Ved alle transporter blev distance, varighed, antal pauser og disses varighed registreret.

Undersøgelse efter ankomst til slagteriet

Ved ankomst til slagteriet fik den stedlige embedsdyrlæge udleveret en liste, svarende til chaufførens, med CKR-numre på alle de køer på transporten, som var omfattet af dyreforsøgstilladelsen. Efter aflæsning gennemgik køerne det rutinemæssige levende syn og blev herefter opstaldet i en fællesboks. Køerne var ikke fikseret i fanggitter og bevægede sig frit rundt i boksen. Dette, i kombination med et forhøjet stressniveau som følge af transport, aflæsning, og sortering, samt nye lyde, lugte og omgivelser vanskeliggjorde en nøjagtig gentagelse af den kliniske undersøgelse fra besætningen. Derfor var der primært tale om en visuel inspektion med fokus på almenbefindende, halthed, sår og mælkeløb.

Halthed blev defineret som halthedsscore 3 eller mere. Forværring af halthed i løbet af transporten blev defineret som enhver stigning i halthedsscore undtagen stigning fra score 1 til 2, idet køer med halthedsscore 2 ikke blev betragtet som halte. Sår blev defineret som en læsion, der gennembrød alle hudens lag og målte mindst 1x1 cm og sårenes placering blev inddelt i fire grupper: Ben (defineret som forben op til og med albueledet og bagben op til og med knæledet); krop og hale; yver; eller hoved og hals. Mælkeløb blev defineret som mælk, der kontinuert dryppede eller flød fra en eller flere pletter.

Data fra Kvægdatabasen

Som supplement til de kliniske data blev der efterfølgende indhentet data fra Kvægdatabasen omhandlende de involverede køers alder, laktationsnummer, sidste kælvningsdato, mælkeydelse og registrerede sygdomsbehandlinger.

Opsummering af registreringer

Registreringerne fordelte sig i tre grupper: Kliniske registreringer før og efter transport (f.eks. almenbefindende, temperatur og huld), registreringer knyttet til transporten (f.eks. varighed og distance) samt baggrundsoplysninger knyttet til koen (f.eks. laktationsnummer og mælkeydelse). Bilag 2 indeholder en komplet liste over alle registreringer og forklarende variable inkluderet i de statistiske analyser.

Dataanalyse

Data blev analyseret i SAS (Version 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC). McNemar test (PROC FREQ) anvendtes til at sammenligne andelen af køer med halthed, sår og mælkeløb før og efter transport. Her præsenteres andelen (procent før og efter transport) samt de tilhørende P-værdier. Risikofaktorer for forværring af henholdsvis halthed, sår og mælkeløb blev søgt identificeret ved hjælp af følgende trin for hvert af de tre outcomes: 1) De forklarende variable fra den kliniske undersøgelse blev først sorteret

således, at variable med lav forekomst af afvigelser fra det klinisk normale (under 10 køer) blev sorteret fra; 2) Dernæst blev sammenhængen mellem henholdsvis halthed, sår og mælkeløb og de forklarende variable screenet enkeltvis ved hjælp af en univariabel logistisk regressionsmodel (PROC GLIMMIX). Kun variable med en P-værdi $\leq 0,25$ indgik i den videre analyse; og 3) Den endelige analyse gennemførtes ved hjælp af en logistisk regressionsmodel for hvert af de tre outcomes med backwards elimination (PROC GLIMMIX). Resultater præsenteres deskriptivt samt som odds ratio med tilhørende P-værdier. Forklarende variable inkluderet i henholdsvis trin 2 og 3 er markeret i Bilag 2. For alle statistiske analyser anvendtes $P < 0,05$ som signifikansniveau.

Resultater

I alt indgik data ind fra 411 køer.

Udsætningsårsager

Landmændene angav 25 forskellige primære udsætningsårsager, som efterfølgende inddeltes i 6 overordnede grupper: Reproduktion, nedsat ydelse, yverbetændelse (mastitis eller celletal), klov- og lemmelidelser, andet yverrelateret (konformation og læsioner), fordøjelseslidelser (diarré, løbesår m.m.) og andet (alder, temperament m.m.). Af Tabel 1 fremgår at reproduktion, nedsat ydelse og yverbetændelse var de tre vigtigste årsager til udsætning.

Tabel 1. Fordeling af primære udsætningsårsager for de involverede 411 malkekøer. Resultaterne er angivet i procent og antal i parentes.

Udsætningsårsager	
Reproduktion	28,2 % (116)
Nedsat ydelse	25,8 % (106)
Yverbetændelse	14,1 % (58)
Klov- og lemmelidelser	13,1 % (54)
Yver, andet	9,7 % (40)
Andet	5,4 % (22)
Fordøjelseslidelser	3,7 % (15)

Køerne blev udsat efter gennemsnitligt 2,9 laktationer (1-10) og gennemsnitligt 270 dage efter kælvning (15-871 dage). Gennemsnitsalderen ved udsætning var 4,9 år (1,9-12,4). Vurdering af dyrenes huld (2-5) viste at hovedparten af dyrene (63,2 %) var i normalt huld ($>2,5$ og $<4,0$), 15,8 % var magre ($\leq 2,5$) imens 21 % var fede ($\geq 4,0$). Ud af de 411 køer havde 30 % hasetrykninger (hårløse partier, hævelser og eventuelt

egentlige sår på hasernes yderside og/eller inderside). Ældre, ophelede halefrakturer blev fundet hos 5,6 % af køerne.

Fordeling af ture

Dataindsamlingen fordelte sig på 49 ture med i gennemsnit 8,5 køer per tur (3-20). Den gennemsnitlige kørte distance på turene var 129 km (20-339 km), fordelt sådan at 38 % af turene var kortere end 101 km, 42 % af turene var 101-200 km og 20 % af turene var over 200 km lange.

Turene varede i gennemsnit 187 min. (32-510 min.), fordelt med 40 % af turene under 121 min., 35 % på 121-240 min., og 25 % over 240 min. I gennemsnit var der 2 pauser pr. tur (0-6), og den gennemsnitlige samlede varighed af pauser var 48 min. (0-155 min.). I alt fem køer blev skånetransporteret efter landmandens ønske.

Uegnet til transport

Tolv køer blev erklæret uegnede ved den kliniske undersøgelse i besætningen og indgik derfor ikke i projektet. Disse dyr blev vurderet uegnede på grund af svær halthed, feber, meget lav huld og voldsom staldkrampe. Ud af de 411 køer, som indgik i undersøgelsen, ankom kun 9 til slagteriet i en tilstand, som ville have udløst en bedømmelse som uegnede til transport jf. dansk praksis. Disse 9 køer var alle svært halte ved ankomsten (halthedsscore 5). Det lave antal køer som blev uegnede til transport under transporten til slagteriet betyder, at projektets resultater ikke kunne omsættes til et værktøj til på forhånd at udpege uegnede køer.

Uanset at kun et begrænset antal køer blev vurderet til at være uegnede til transport ved ankomsten til slagteriet, så viste tre kliniske parametre sig interessante i forhold til den del af projektets formål, som fokuserede på at vurdere om det var en belastning for dyrene at blive transporteret, idet der her fandtes en signifikant forværring af dyrenes kliniske tilstand efter transport: Halthed, mælkeløb og forekomst af sår (Tabel 2).

Tabel 2. Halte køer og køer med mælkeløb og sår før og efter transport, procent og antal i parentes.
P-værdier fra McNemar test.

Kliniske mål	Før transport	Efter transport	P-værdi
Halthedsscore $\geq$ 3, % køer	30,7 (126)	41,1 (179)	P<0,0001
Mælkeløb, % køer	1 (4)	17 (70)	P<0,0001
Sår, % køer	22,4 (92)	33,8 (139)	P<0,0001

Samlet set blev 19,2 % af køerne halte eller mere halte i løbet af transporten. Af de køer, der allerede var halte ved afgang fra besætningen (halthedsscore 3 og 4), blev 27 % mere halte, mens 15,8 % af de køer, som ikke var halte ved afgang, var halte ved ankomsten til slagteriet. Den maximale ændring i halthedsscore i løbet af transporten var 3 trin, mens det i 65,8 % af tilfældene, hvor en ko blev halt eller mere halt, drejede sig om en stigning i halthedsscore på et enkelt trin i løbet af transporten (Tabel 3).

Tabel 3. Halthedsscore før (x-aksen) og efter (y-aksen) transport til slagteri, antal køer

5			1	8	
4	2	13	25	46	
3	11	19	41	3	
2	33	69	2		
1	130	8			
	1	2	3	4	5

Risikofaktorer for forværring af halthed

Der var ikke nogen signifikant sammenhæng mellem de undersøgte karakteristika ved transporten (varighed, distance eller antal pauser undervejs) og udvikling/forværring af halthed under transporten. Til gengæld viste analyserne højere odds for at ankomme halt eller mere halt til slagteriet for dyr med lav huldsscore, tidlig eller sen laktation, kliniske tegn på digital dermatitis på bagbenene samt tilstedeværelsen af skævt bækken (Tabel 4).

Tabel 4. Odds ratio for forværring af halthed under transport.

Risikofaktorer	Odds ratio
Laktationsstadium (P=0.015)	
Tidlig	1,9
Midt	1
Sen	2,6
Huldsscore (P=0,0011)	
≤2,75	3,7
2,75-3,75	1
≥3,75	0,7
Digital dermatitis (P=0,001)	
Ja	3,0
Nej	1
Skævt bækken (P=0,0011)	
Ja	4,9
Nej	1

Risikofaktorer for forværring af mælkeløb

Der var signifikant sammenhæng mellem forværring af mælkeløb efter transporten og laktationsstadium og transportens distance. Således havde køer tidligt i laktationen signifikant højere odds for forværring af mælkeløb efter transport sammenlignet med køer senere i laktationen. Køer, der blev transporteret langt, havde ligeledes højere odds for forværring af mælkeløb (Tabel 5).

Tabel 5. Odds ratio for forværring af mælkeløb under transport.

Risikofaktorer	Odds ratio
Laktationsstadium (P=0,04)	
tidlig	2,9
midt	1,3
sen	1
Transportdistance (P=0,006)	
≥200 km	10,2
101-200 km	8,6
<101 km	1

Forværring af sår

Før transport havde 22,4 % af køerne sår, og af disse havde over halvdelen mere end ét sår. I alt 183 sår blev således registreret før transporten. Alle var skorpebeklædt og dermed under opheling. Efter transport havde 33,8 % af køerne sår (både gamle og nye). I alt registreredes 103 nye, blødende sår samt 9 gamle sår med afrevne sårskorper (Tabel 6). Før transport var sårene på benene primært placeret på haserne (66,3 % af alle sår på ben), efter transport primært på koderne (64,6 % af alle sår på ben). Sårene på kroppen var før transport primært placeret på lårene (55,7 % af alle sår på krop), efter transport primært på hoftehjørner og sædeben (40 % af alle sår på krop). Mindst 12 køer vurderes ud fra deres tilsøling og eventuelle sår at have været nede at ligge undervejs. Analyserne viste ingen signifikant sammenhæng mellem stigningen i forekomsten af sår og de forklarende variable.

Tabel 6. Fordelingen af sår før og efter transport af malkekøer til slagteri, procent og antal i parentes.

Placering af sår	Før transport	Efter transport (kun nye sår)
Ben	55,2 % (101)	62,1 % (64)
Krop og hale	32,8 % (60)	33,0 % (34)
Yver	8,7 % (16)	3,9 % (4)
Hoved og hals	3,3 % (6)	1,0 % (1)
Total	100 % (183)	100 % (103)

Diskussion

Dette projekt er det første af sin art på verdensplan og har genereret ny viden om risikoen for forværring af udsatte malkekøers kliniske tilstand, og dermed for graden af belastning og dyrenes transportegnethed, efter transport til slagteri (med en transportvarighed på under 8 timer). Resultaterne danner grundlag for anbefalinger eller retningslinier for transport af malkekøer, som på kort sigt vil kunne implementeres i praksis og være til gavn for såvel dyrenes velfærd som branchens arbejdsvilkår og myndighedernes mulighed for kontrol. Projektets delresultater diskuteres nedenfor.

Ved den kliniske undersøgelse i besætningen fandtes generelt et lavt antal afvigelser fra normalen. Et stort antal køer havde dog forøget respirationsfrekvens (over 30 åndedrag/min.) og/eller forhøjet puls (over 80 slag/min.). Det er velkendt, at stress kan give anledning til forøget respirationsfrekvens og forhøjet puls. Sammenholdt med de øvrige kliniske fund findes det overvejende sandsynligt, at disse ændringer skyldes, at det for køerne blev oplevet som stressende at blive fikseret, undersøgt og berørt overalt på kroppen.

Et vigtigt resultat af undersøgelsen er fundet af at 19,2 % af køerne blev halte eller mere halte under transporten. I modsætning til en tidligere undersøgelse af ændringer i halthed som følge af transport af malkekøer gennemført på ikke-halte køer (Thomsen og Sørensen, 2013), så viser nærværende undersøgelse – som jo involverede udsætterkøer, dvs. køer, der var udpeget af landmanden til slagtning – at køernes halthedsscore i mange tilfælde blev øget af transport (at de enten blev halte eller mere halte). Projektet kan ikke som sådan redegøre for kausaliteten i dette fund. En oplagt mulighed relaterer til udsætterkøernes tilstand – at de jo udsættes fra produktionen af en grund, og derfor vil kunne være mere påvirkelige overfor de påvirkninger, som dyrene oplever under transporten end yngre køer, som landmanden ikke har valgt skal udsættes. Det kan dog ikke udelukkes, at det kan være faktorer knyttet til kommercielle transportere (såsom sammenblanding af dyr fra flere besætninger, aflæsning eller ophold på slagteri), som jo indgik i denne undersøgelse, og ikke i samme grad i undersøgelsen af Thomsen og Sørensen (2013), der ligger til grund for de to funds forskellighed.

Afklaring af årsagsfaktorer samt muligheder for at etablere transportforhold for udsætterkøer hvor køerne ikke bliver halte eller mere halte, kræver yderligere undersøgelser. Nærværende resultater kan dog – allerede på kort sigt – indgå i anbefalinger for såvel branche som myndigheder, og dermed være med til at sikre såvel dyrenes velfærd som branchens arbejdsvilkår og myndighedernes mulighed for kontrol. For eksempel viste resultaterne, at køer, som før transporten havde en synlig skævhed i bækkenet havde en øget risiko for at blive halte eller mere halte efter transporten. Sådanne skævheder kan relativt let erkendes af landmand og transportør før læsning. For disse dyr vil det derfor være muligt at etablere anbefalinger om f.eks. skånetransport.

Som det fremgår af tabellerne ovenfor, så viser resultaterne tydeligt, at selvom kun meget få køer ankom til slagteriet i en tilstand, der var uegnet til transport, er dette ikke ensbetydende med at køerne ikke blev belastede under transporten. Tre af de fire kliniske registreringer udført efter transporten (halthed, mælkeløb og sår) viste således en forværring i forhold til tilstanden før transport. Kort sagt, så betyder dette at selvom Transportforordningens (EU 1/2005) foreskrifter vedrørende transportegnethed overholdes, så er transport af udsætterkøer til slagteri under kommercielle, danske forhold en udfordring for mange af dyrenes velfærd. For eksempel er den betydelige forøgelse i antal halte køer ved ankomsten til slagteriet (set i forhold til antal halte ved læsning i besætningen) et velfærdsproblem, hvis løsning kræver yderligere undersøgelser.

Vores analyser viste imidlertid ikke sammenhæng mellem karakteristika ved transporten (distance, varighed, pauser) og forværringen af halthed efter transport, hvorfor det sandsynligvis ikke er via justeringer heri at antallet af malkekøer, som er halte ved ankomsten til slagteriet, kan reduceres. I alt blev kun 5 køer (svarende til 1,2 % af de involverede køer) skånetransporteret. Det er muligt at øget halthed ved ankomst til slagteriet i fremtiden kan begrænses ved øget anvendelse af for eksempel skånetransport, mindre gruppestørrelser, udvikling af blødere og mere skridsikre underlag i lastbilerne eller lignende tiltag. Dokumentation herfor kræver imidlertid yderligere undersøgelser.

Mælkeløb er et andet eksempel på, at transport kan være en belastning for malkekøer. Mange køer slagtes på et tidspunkt i laktationen, hvor mælkeydelsen stadig er relativt høj. Som det fremgår af Tabel 2, havde stort set ingen af de 411 køer mælkeløb før afgang fra besætningen, hvor der også er krav om at lakterende køer skal malkes umiddelbart inden læsning og derefter med et maksimalt tidsinterval på 12 timer. Undersøgelsen viser imidlertid, at næsten 1/5 af køerne havde mælkeløb ved ankomsten til slagteriet. Forekomst af mælkeløb associeres i dag ikke som sådan med uegnethed til transport, men det er velkendt (f.eks. fra studier af afgoldning) at manglende malkning er forbundet med reduceret velfærd for malkekøer (Bertulat et al., 2013; Chapinal et al., 2014; Bach et al., 2015), og lakterende udsætterkøer er derfor udsat for belastning i form af både transport og manglende malkning. Der vil, hvis man søger at begrænse den velfærds-mæssige belastning forbundet med slagtedagen og transport så meget som muligt, være brug for yderligere fokus på at minimere forekomst af mælkeløb, for eksempel ved øget fokus på malkning lige før transporten eller - allerede i dagene før transport - at benytte managementrutiner kendt fra afgoldningsperioden, som kan medvirke til at reducere mælkeproduktionen. Delprojekt 2 er blandt de allerførste undersøgelser til at fokusere på den kombinerede belastning forbundet med transport og manglende malkning, og der findes endnu ikke dokumentation for effekten af tiltag, som kan reducere køernes mælkeproduktion før de transporteres til slagtning.

Det var, fra projektets begyndelse, en delmålsætning, at indsamle information om køernes adfærd under selve transporten for på den måde, at få viden om, hvorvidt det var her, og i givet fald hvordan, køernes tilstand blev forværret, eventuelt til en grad, hvor de var uegnede til transport. I projektet valgte vi imidlertid at prioritere at indsamle kliniske data fra så mange køer som muligt før og efter transport, og nedprioriterede indsamling af videodata under transporterne. Projektets resultater, hvor køernes halthedsscore ofte forværredes under transporten, ligesom forekomsten af sår steg, kalder imidlertid på fremtidige undersøgelser under såvel kørsel som pauser samt på muligheden for fremadrettet at udvikle nye procedurer og faciliteter. En sådan forsknings- og udviklingsindsats kunne fokusere på eksempelvis fysiske forhold såsom lastetæthed, gulvtyper, strøelse, skillerum og disses vekselvirkninger, for dermed at søge at begrænse risikoen for at køerne kommer frem til slagteriet som halte, mere halte eller på anden vis skadede. Dette kan på sigt åbne mulighed for mærkningsordninger eller lignende, som dokumenterer, at køer er kørt under forhold, der i særlig grad tilgodeser deres velfærd.

Ved valg af studiedesign vælges altid mellem en række fordele og ulemper. I en situation som den aktuelle, hvor der findes meget begrænset forskning indenfor området, er et observationelt studie en god initial metode til at afdække virkeligheden og få indblik i faktiske forhold, inden man begynder at designe opfølgende eksperimentelle studier med mulighed for intervention. Delprojekt 2 har, med de ovennævnte data fra over 400 køer, etableret det hidtil største datasæt i verden på dette område. Samtidig er der skabt god forbindelse til virksomheder og brancher, som ikke hidtil i særlig grad har været involveret i forskning. Her tænkes specielt på vognmænd og chauffører. Fremadrettet åbner projektets resultater derfor rig mulighed for opfølgende, eksperimentelle studier med fokus på muligheder for at transportere udsætterkøer under forhold der tilgodeser velfærden hos netop denne dyregruppe. Herunder vil det formodentlig være gavnligt at indtænke projekter med fokus på uddannelse af involveret personale (som foreslået af Hels (2016) i nylig specialrapport).

Ulemperne ved dette observationelle studie har bl.a. været, at det var arbejdskrævende at skaffe frivillige deltagende landmænd og vognmænd - alle har deres egne arbejdsgange og tidsplaner at tage hensyn til. Dertil kommer, at man med udelukkende frivillige deltagere må overveje, om dette kan udgøre en mulig fejlkilde. Det kan ikke udelukkes, at kun de dygtigste vognmænd og landmænd med størst interesse for dyrevelfærd har meldt sig. Dette er forsøgt imødegået ved at love alle fuld anonymitet og fritagelse for juridisk ansvar i forbindelse med transportegnethed, for derved at motivere flere, og ikke kun de, der føler sig dygtigst, til at melde sig. Andre ulemper ved dette studiedesign har været mangel på kontrol: Man kan ikke teste én ting ad gangen, på trods af indsats for at standardisere, så vil dataindsamlingen i et vist omfang foregå under uens og vekslende forhold, f.eks. er køerne blevet halthedsscoret på tørre spalter, på glatte spalter, i dagslys, i tussmørke osv. En yderligere faktor vil være den indbyggede konfundering mellem den enkelte besætning og transportdistance. Endelig må man til enhver tid indrette sig efter deltagernes tidsplaner og behov, og acceptere at kommercielle interesser kan komme til at stå over forskningsbehov. Sådanne ulemper og mulige fejlkilder, må ikke glemmes når resultaterne fortolkes eller søges anvendt i praksis.

Konklusion

Dette projekt er det største af sin art på verdensplan og har genereret ny viden om risikoen for forværring af den kliniske tilstand hos udsætterkøer (og dermed deres transportegnethed) efter transport til slagteri under kommercielle, danske forhold. Projektet har for eksempel vist, at køer i løbet

af transport til slagteriet kan blive halte eller mere halte, få mælkeløb og pådrage sig sår. Risikofaktorer for at blive halt eller mere halt under transporten er laktationsstadium (tidlig eller sen laktation), lavt huld ($\leq 2,5$), digital dermatitis på bagbenene eller skævt bækken. Risikofaktorer for mælkeløb er laktationsstadium (tidlig laktation) og transportlængde (>101 km). Vi kunne ikke identificere signifikante risikofaktorer for pådragelse af sår. Kun et lavt antal køer nåede frem til slagteriet i uegnet tilstand, og det er på baggrund af dette datamateriale ikke muligt at udvikle et værktøj til at udpege uegnede køer før afgang fra besætningen. Projektets resultater danner grundlag for opstilling af anbefalinger eller retningslinjer for transport af udsætterkøer, som på kort sigt vil kunne implementeres i praksis og være til gavn for såvel dyrenes velfærd som branchens arbejdsvilkår og myndighedernes mulighed for kontrol. Endvidere kan projektets resultater danne grundlag for fremadrettet forskning og udvikling af såvel nye managementrutiner, faciliteter som procedurer – på tværs af såvel branche som myndigheder - der vil kunne reducere velfærdsbelastningen forbundet med transport for disse dyr, herunder begrænse transport af dyr som ikke er egnede dertil, og lette arbejdsgange forbundet med vurderingen af dyrenes transportegnethed.

Referencer

Anonym 2016. Danmarks Statistik: Slagtninger og produktion af kvæg efter kategori og enhed.

<http://statistikbanken.dk/ANI4>

Bach A. et al. 2015. Short communication: The effects of cabergoline administration at dry-off of lactating cows on udder engorgement, milk leakages, and lying behavior. *Journal of Dairy Science*. 98: 7097–7101, doi:10.3168/jds.2015-9751

Bertulat S et al. 2013. Measurement of fecal glucocorticoid metabolites and evaluation of udder characteristics to estimate stress after sudden dry-off in dairy cows with different milk yields. *Journal of Dairy Science* 96: 3774–3787, doi:10.3168/jds.2012-6425

Carlsen JC. 2016. Personlig meddelelse. Konsulent, Danish Crown A/S, Energivej 5, 6670 Holsted.

Chapinal N et al. 2014. Changes in lying behavior after abrupt cessation of milking and regrouping at dry-off in freestall-housed cows: A case study. *Journal of Veterinary Behavior* 9: 364-369.

Dalberg-Larsen J, Nielsen JG. Lex specialis i Den Store Danske, Gyldendal.

<http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=116403>

Ferguson JD et al. 1994. Principal Descriptors of Body Condition Score in Holstein Cows. *Journal of Dairy Science* 77: 2695-2703.

Hels, A. 2016. Kreaturchaufførers viden om og erfaringer med malkekøers transportegnethed. Masterspeciale, MVHP, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, 35 sider.

Houe H, Ersbøll AK, Toft N. 2004. Introduction to Veterinary Epidemiology. Biofolia, Frederiksberg C. 398 sider.

Nielsen BL, Dybkjær L., Herskin MS. 2011. Road transport of farm animals: effects of journey duration on animal welfare. *Animal* 5: 415-427.

OIE World Organization for Animal Health. Terrestrial Animal Health Code, 2016, <http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/> (tilgået online Okt 2016).

Thomsen PT et al. 2008. Evaluation of a Lameness Scoring System for Dairy Cows. *Journal Dairy Science* 91:119–126, doi:10.3168/jds.2007-0496.

Thomsen PT, Sørensen JT. 2013. Does short-term road transport affect the locomotion score of dairy cows? *Animal Welfare*, 22: 445-447, doi:10.7120/09627286.22.4.445



Foto: Kirstin Dahl-Pedersen, AU.

KLINISK UNDERSØGELSE AF KØR I TRANSPORTPROJEKTET 2015

Klinisk journal

KO-ID-NR:

CHR-NR:

BESÆTNING/SLAGTERI

DATO:

KLOKKESLÆT:

OBSERVATØR:

UDSÆTTERÅRSAG			
DRÆGTIGHEDSSTADIE		SIDSTE MALKNING KL.	

ALMEN TILSTAND	JA	NEJ		JA	NEJ	KOMMENTARER
Vågen, interesseret			Ørespil			
Nedstemt, uopmærksom			Drøvtygning			
Stærkt nedstemt, fraværende			Næsetoilette			
Exciteret, urolig			Tænderskæren			
Vokalisering			Indsunkne øjne			
Muskelsitren						

HULD (1-5)		KOMMENTARER
RESPIRATION (resp/min)		
TEMPERATUR		
PULS (slag/min)		

HÅRLAG	JA	NEJ	KOMMENTARER	LYMFENUDER	JA	NEJ	KOMMENTARER
Normalt				Normale			

HUD				KOMMENTARER
Sår	Placering (tegnes)	Størrelse (cm x cm)	Karakteristika (åbent, skorpe, blødning, pus, hævelse)	
Elastisitet	Normal	Nedsat		

RESPIRATION	JA	NEJ	KOMMENTARER
Regelmæssig			
Ubesværet, thoracoabdominal			
Overfladisk, thoracal			
Anstrengt, abdominal			
Flåd fra næse			
Hoste			
Mislyde ved auskultation af lunger			
Andet			

KREDSLØB	Normal	Andet	KOMMENTARER
Slimhinder			
Kapillærfyldningstid		Forlænget, sek.:	
Hudtemp. ører + ben		Nedsat	
Halsvene, fyldning		Fyldt/Spændt	
Venepuls		½ ¾ 1/1	
Staseprøve			
Ødemer	Ingen	Gulk/Doglap/Yver/Andet	
Auskultation af hjertet		Arytmi/Mislyde	
Andet			

FORDØJELSE	JA	NEJ	KOMMENTARER
Normal peristaltik ved auskultation af vom			
Svajer ud for ryggreb			
Rektalprolaps			
Andet			

URIN- OG KØNSORGANER	JA	NEJ	KOMMENTARER
Flåd			
Udrivninger			
Vaginalprolaps			
Andet			

MÆLKEKIRTEL	HF	VF	HB	VB	KOMMENTARER
Normal					
Sår					
Rødme, hævelse, ømhed					
Mastitis					
Fyldning	Goldt/tomt/let fyldt/fyldt/spændt				
Andet					

BEVÆGEAPPARAT	HF	VF	HB	VB	KOMMENTARER
Normal muskelfylde					
Trykning					
Bursitis					
Arthritis					
Digital dermatitis					
Forvoksede klove					
Andet					
Halthedsvurdering (1-5)					

NERVESYSTEM	JA	NEJ	KOMMENTARER
Normal hørelse			
Normalt syn			
Andet			

Oversigt over registreringer med markering (*) af de forklarende variable, der blev yderligere analyseret

Registreringerne kan inddeles i tre grupper: 1) Registreringer af koens kliniske tilstand, før og efter transport, 2) registreringer knyttet til selve transporten, 3) baggrundsoplysninger om koen indhentet fra Kvægdatabase.

Kliniske registreringer før transport	Antal køer afvigende fra normalen	Variable, der blev enkeltvis screenet	Variable, der blev yderligere analyseret efter screening
Almenbefindende	3		
Vokalisering	0		
Ørespil	0		
Drøvtygning	18	*	
Tænderskæren	1		
Næsetoilette	21	*	
Muskelsitren	3		
Indsunkne øjne	0		
Huld	127	*	*
Respirationsfrekvens	106	*	*
Temperatur	0		
Puls	202	*	
Hårlag	51	*	*
Sår	93	*	*
Hudelasticitet	5		
Lymfeknuder	48	*	
Respiration	10	*	
Hoste	3		
Næseflåd	0		
Auskultationsfund, lunger	38	*	
Slimhinder	4		
Kapillærfyldningstid	2		
Hudtemperatur	2		
Venefyldning	20	*	
Venepuls	10	*	
Venestaseprøve	3		
Ødemer	2		
Auskultationsfund, hjerte	17	*	
Auskultationsfund, vom	3		
Ryggrebsprøve	50	*	
Rektalprolaps	0		
Vaginalflåd	4		
Vaginalprolaps	0		
Udrivninger	0		
Yverrødme, hævelse, ømhed	83	*	
Mælkeløb	4		*
Muskelfylde, forben/bagben	0/32	*	
Trykning, forben/bagben	10/126	*	
Bursitis, forben/bagben	8/20	*	

Artritis, forben/bagben	3/8		
Digital dermatitis, forben/bagben	24/77	*	*
Forvoksede klove, forben/bagben	7/9		
Skævt bækken	16	*	*
Halthedsscore	128	*	*

Kliniske registreringer efter transport	Antal køer afvigende fra normalen	Variable, der blev enkeltvis screenet	Variable, der blev yderligere analyseret
Almenbefindende	0		
Sår	141	*	*
Mælkeløb	70	*	*
Halthedsscore	170	*	*

Registreringer knyttet til selve transporten	Variable, der blev enkeltvis screenet	Variable, der blev yderligere analyseret
Distance i km	*	*
Samlet varighed i min	*	*
Antal pauser	*	
Samlet varighed af pauser i min	*	*
Skånetransport		

Baggrundsoplysninger fra Kvægdatabase	Variable, der blev enkeltvis screenet	Variable, der blev yderligere analyseret
Alder i dage	*	*
Race	*	
Antal laktationer	*	
Dage efter kælvning	*	*
Ydelse ved sidste kontrol (kg mælk)	*	*
Sygdomsregistreringer indenfor 6 måneder før slagtning, underopdelt i fem grupper: Mastitis, metaboliske lidelser, klov-lemmelidelser, reproduktionslidelser, andet	*	*

Liste over nationale og internationale møder og kongresser, hvor planer for, status for og delresultater fra delprojekt 2 har været præsenteret

Nationale:

Boologisk Selskabs forårsseminar, april 2014. Mundtlig præsentation.

Den Danske Dyrlægeforening, medlemsmøde i sektion Kvæg, september 2015. Mundtlig præsentation.

Klovforum, september 2015. Mundtlig præsentation.

CPH Cattle, november 2015. Mundtlig præsentation.

Dyreforsøgstilsynets miniseminar om produktionsdyr, oktober 2016. Mundtlig præsentation.

Internationale:

European Federation of Animal Science, EAAP, Annual meeting, august 2014, Danmark. Poster.

Humane Slaughter Association Symposium, juli 2015, Kroatien. Poster.

World Buiatrics Conference, juli 2016, Irland. Poster.

Delprojekt 3: Transportegnethed hos slagtesøer

Karen Thodberg, Katrine Kop Fogsgaard, Charlotte Gaillard og Mette S. Herskin

Dansk resume

Årligt transporteres ca. 400.000 danske søer til slagtning. Andelen af disse dyr, der slagtes i henholdsvis Danmark og udlandet, varierer fra år til år afhængigt af udbud og efterspørgsel. Antallet af soslakterier i Danmark er faldende, og som en følge heraf er afstanden fra besætning til nærmeste slagteri øget. Slagtesøer udgør en særlig udsat dyregruppe i forhold til transport, idet de typisk sendes til slagtbetinget af reduceret produktion, og derfor ofte har forskellige sygdomme, skader eller svækkelser, som kan gøre transporten mere belastende end for yngre slagtesvin. I lyset af ovenstående er det derfor iøjnefaldende, at der til dato ikke findes undersøgelser – hverken nationalt eller internationalt – som har fokuseret på belastning forbundet med transport af netop disse dyr, eller på dyrenes egnethed til transport.

Formålet med Delprojekt 3 var derfor, parallelt med Delprojekt 2, med udgangspunkt i transporter af udsættersøer fra besætning til slagteri afviklet under danske, kommercielle forhold, at: 1) kvantificere ændringer i relevante mål for belastning og transportegnethed hos søer efter transport til slagteri (med en varighed på under 8 timer) for at besvare spørgsmålet: Kan transport af disse dyr føre til en forværring af deres tilstand?; 2) identificere risikofaktorer (knyttet til såvel soen som transporten) for forværring af dyrenes tilstand i løbet af transporten. Om muligt skulle projektets resultater omsættes til et værktøj til at udpege søer, som er uegnede til transport før afgang fra besætningen.

Projektet var et observationelt studie af slagtesøer, som blev transporteret til slagtning i perioden januar 2015 – februar 2016 fra danske produktionsbesætninger. Søerne blev undersøgt klinisk i besætningen inden læsning og herefter læsset, transporteret og aflæsset på Danish Crowns soslakteri i Skærbæk. På slagteriet gennemgik søerne det rutinemæssige levende syn og blev slagtet efter at have gennemgået endnu en klinisk undersøgelse. De deltagende svineproducenter udpegede selv søerne til slagtning, og udlevering, læsning, transport og aflæsning forløb som normalt.

I alt indgik 522 søer fra 12 besætninger, og data blev indsamlet fra i alt 47 ture, kørt af chauffører fra 7 vognmandsfirmaer. Kun 3 af de 522 deltagende søer ankom til slagteriet i en tilstand, der kunne tyde på egnethed til transport (jf. nuværende praksis), hvorfor det ikke var muligt at omsætte projektets resultater til et værktøj til at udpege uegnede søer før afgang fra besætningen.

Søerne blev udsat efter gennemsnitligt 5 læg (1-11), den gennemsnitlige huldscore var 3,2 (2-4,5), og 39,1 % af dyrene var lakterende på transportdagen. Dataindsamlingen fordelte sig på 47 ture med i gennemsnit 11,1 søer per tur. Den gennemsnitlige kørte distance på turene var 179 km (29-386 km). Turene varede i gennemsnit 235 min. (46-469 min.). I gennemsnit var der 2,4 pauser pr. tur (0-7), og den gennemsnitlige samlede varighed af pauser var 27 min (0-172 min). Søerne ventede i gennemsnit i 36 min (0-135 min) før aflæsning på slagteriet. Den gennemsnitlige temperatur i lastbilerne under transporten var 14,1 °C (3,4-26,1 °C).

Samlet viser resultaterne at søernes kliniske tilstand, for en række mål, blev forværret under transporten. Eksempler herpå er respirationsfrekvens ($P<0,001$), hudelasticitet som mål for dehydrering ($P<0,001$), forekomst af afrevne klove ($P<0,02$), forekomst af sår ($P<0,001$), skrammer ($P<0,001$), vulvalæsioner ($P<0,001$) samt en forøget halthedsscore ($P<0,001$).

Blandt de fundne risikofaktorer for denne forværring tegnede sig et billede af at det især var faktorer knyttet til transporten, og ofte i interaktion med hinanden, som udgjorde den betydeligste risiko for forværringen af dyrenes tilstand. Eksempler herpå er transportens varighed, varigheden af ophold på slagteriets område før dyrene blev aflæst, varigheden af pauser under transporten og temperaturen i lastbilen under transporten. Der var dog også eksempler på at tilstedeværelsen af so-relaterede faktorer, som udgjorde en risiko for forværring af dyrenes tilstand. Blandt eksemplerne herpå var, at ikke-lakterende søer havde øget risiko for at have fået flere skrammer sammenlignet med de lakterende dyr ($P<0,01$) og at søer med læsioner, udflåd eller andre problemer knyttet til vulva ligeledes havde øget risiko for at ankomme til slagteriet med flere skrammer, end dyr uden disse lidelser ($P<0,05$). Søer med klovproblemer havde øget risiko for at blive mere halte under transporten, sammenlignet med søer uden klovproblemer ($P<0,01$).

Generelt var den enkelte sos tilstand før transport imidlertid en dårlig indikator for tilstanden ved ankomst til slagteriet. Typisk havde før-tilstanden i de forskellige kliniske mål signifikant betydning for graden af forværring, men således at en god tilstand, som for eksempel få skrammer, medførte øget sandsynlighed for en forværring. Dette tyder derfor ikke på, at søer i en allerede dårlig tilstand, havde en forøget risiko for at blive mindre transportegnede undervejs til slagteriet, nærmest tværtimod.

Dette projekt har, på en række områder, genereret ny viden om risikoen for forværring af den kliniske tilstand hos udsættersøer (og dermed deres transportegnethed) efter transport til slagteri under kommercielle, danske forhold. Samlet set viser Delprojekt 3 at slagtesøers kliniske tilstand forværres under transport, dog sjældent i en grad, så de (jf. nuværende praksis) kan betragtes som uegnede til transport ved ankomsten til slagteriet. Blandt de væsentligste risikofaktorer herfor er karakteristika ved transporten, og i mindre grad karakteristika ved dyrene. Projektets resultater danner grundlag for opstilling af anbefalinger eller retningslinjer for transport af slagtesøer. Sådanne vil på kort sigt kunne implementeres i praksis og være til gavn for såvel dyrenes velfærd som branchens arbejdsvilkår og myndighedernes mulighed for kontrol. Endvidere kan projektets resultater, tilsvarende Delprojekt 2, danne grundlag for fremadrettet forskning og udvikling af såvel nye managementrutiner, faciliteter og procedurer – på tværs af såvel branche som myndigheder - der vil kunne reducere velfærdsbelastningen forbundet med transport for disse dyr og lette arbejdsgange forbundet med vurderingen af dyrenes transportegnethed.

Summary

In Denmark, approximately 400,000 sows are sent for slaughter each year. The proportion of these animals slaughtered in Denmark and abroad varies, depending on the market. Internationally, the number of slaughterhouses accepting sows is decreasing leading to a need to transport these animals for increasing distances. Cull sows are vulnerable towards transport stress, as they are typically culled after years of production, and hence may be sick or weak as compared to younger slaughter pigs. However, to date no scientific studies – nationally or internationally – have focused on the consequences of transport or the pre-transport fitness for transport for this specific group of animals.

The aims of this project were, in parallel to Project 2 and based on transport of cull sows from farm to slaughter in Denmark, to: 1) quantify changes in relevant clinical measures of fitness for transport as well as the severity of transport stress after transport to slaughter (duration up to 8 hours) in order to answer the question: Does transport of cull sows lead to a worsening of their clinical condition?; and 2) identify risk factors (associated with the sow as well as the transport) for a potential worsening of the clinical condition of the sows during transport. If possible, these results were to be formulated into a tool to be used by farmers and drivers in order to be able to perform a pre-transport assessment of fitness for transport.

The project consisted of an observational study involving 522 cull sows, transported to slaughter between January 2015 and February 2016 from 12 Danish commercial sow herds. The sows were examined clinically on-farm before loading, and then transported to Danish Crown's slaughterhouse in Skærbæk, Denmark. At the slaughterhouse, the sows passed the routine veterinary inspection and were slaughtered after a second clinical examination. Sows to be included in the study were selected by the farmers, and all management on the day of slaughter followed normal, commercial procedures. The study included 47 trips (with a mean of 11,1 sows per trip) and transport trucks from 7 livestock driving companies.

The mean transport distance was 179 km (29-386 km) and the mean transport duration was 235 (46-469 min). The average number of pauses per trip was 2.4 (0-7) with a mean total duration of 27 min (0-172 min). The sows waited on average 36 min (0-135 min) before unloading at the slaughterhouse. The mean temperature in the trucks during transport was 14.1 °C (3.4-26.1 °C). The sows were culled at a mean parity of 5 (1-11), had a mean body condition score of 3.2 (2-4.5), and 39,1 % of the animals were lactating on the day of transport.

Taken together, the analyses show that the clinical condition of sows is worsened by transport to slaughter. This was found for a number of the clinical measures such as respiratory frequency ($P<0.001$), skin elasticity as an indicator of dehydration ($P<0.001$), claws torn off ($P<0.02$), skin lesions ($P<0.001$), scratches ($P<0.001$), vulva lesions ($P<0.001$) and lameness score ($P<0.001$). Only 3 sows arrived at the slaughterhouse in a clinical condition, which would have been considered unfit for transport according to current Danish practice. This low number of animals being unfit for transport upon arrival, meant that the results could not be used to formulate a tool for the pre-transport assessment of fitness for transport.

From the risk analyses, it is evident that especially the factors related to the transport, and often interacting, turned out as risk factors for worsening of the clinical conditions of the sows. Examples of this are duration of transport, waiting time in the truck before unloading at the slaughterhouse, duration of pauses during transport, and the temperature inside the truck during transport. There are, however, also some examples of risk factors related to the sows, such as an increased risk of scratches for non-lactating animals as compared with lactating ($P<0.01$), increased risk of scratches for sows with vulva lesions or other clinical problems associated to the vulva region ($P<0.05$). In addition, sows with claw problems had a higher risk of arriving with an increased lameness score ($P<0.01$).

In general, however, the quality of the pre-transport condition of a sow as indicator of her condition upon arrival at the slaughterhouse is not high. Typically, the pre-transport level of the clinical measures

did affect the degree of worsening, but in a way such that sows in a good pre-clinical condition were more likely to experience worsening. Hence, in general these results are not suggesting that sows in a relatively poor clinical condition pre-transport are the most at risk of worsening after transport due to their pre-condition.

Over all, this project shows that the clinical condition of cull sows are worsened by transport under commercial, Danish conditions, however only rarely to an extent where they (according to current practice) could have been considered unfit for transport upon arrival. Among the most important risk factors for the worsening of the clinical condition of the sows are transport-related factors, and to a lesser degree factors related to the sows.

The results of the project provide strong support for future recommendations and guidelines – to be implemented in a short time span - for transport of cull sows. Such recommendations would benefit the welfare of cull sows during transport, and be able to support the pig industry, the animal transport industry as well as the controlling authorities. In addition, the results call for future research and development within new management routines, facilities and procedures – across the industry and the authorities – in order to improve the welfare of cull sows as well as to facilitate working procedures related to the transport of cull sows and the assessment of fitness for transport of these animals.

Baggrund

Baggrunden for Delprojekt 3 er, at danske svineproducenter årligt transporterer omkring 400.000 søer til slagtning. Antallet af soslakterier i Danmark er faldende, hvorfor afstanden fra besætning til nærmeste slagteri øges. Afhængig af udbud og efterspørgsel bliver et varierende antal af de danske søer slagtet udenfor landets grænser. På trods af, at slagtesøer udgør en særligt udsat dyregruppe i forhold til transport, på grund af deres alder og stadie i produktionscyklus (Nielsen et al., 2011; OIE, 2016), findes der til dato kun meget få videnskabelige undersøgelser med fokus på disse dyr, deres velfærd eller egnethed til transport (hvilket Grandin (2016) har konkluderet i et netop publiceret review om emnet).

Man ved dog, at en række faktorer, såsom genotype, staldsystem samt produktionsstrategi har betydning for, hvilke og hvornår søer udsættes fra kommercielle besætninger (de Jong et al., 2014). Nylige undersøgelser med fokus på indrapportering fra landmænd har imidlertid vist at den overvejende udsætningsårsag er problemer med dyrenes sundhed (f.eks. Zhao et al., 2015). Tilsvarende konklusioner er draget på baggrund af kliniske undersøgelser af søer ved ankomsten til slagt i såvel Europa (de Jong et al., 2014) som USA (Knauer et al., 2007). Flere studier har endvidere vist, at en ikke ubetydelig andel af søer udsættes efter fravænning (de Hollander et al., 2015; Engblom et al., 2007). For nyligt publicerede McGee et al. (2016) resultater fra en undersøgelse af svin aflæstet ved amerikanske auktionshuse, og fandt at udsætterdyr (søer og orner samlet) udgjorde hovedparten af de observerede udmattede og halte dyr. Fælles for alle ovennævnte referencer er imidlertid, at de kun har fokuseret på dyrenes tilstand enten før eller efter transporten. Der findes således i dag reelt ingen undersøgelser – hverken nationalt eller internationalt – som har fokuseret på disse dyrs transportegnethed eller på betydningen af transport for dyrenes velfærd.

Formål

Formålene med Delprojekt 3 var at etablere:

- 1) ny viden om ændringer i relevante mål for belastning og transportegnethed hos slagtesøer efter transport til slagteri (<8t) for at besvare spørgsmålet: fører transport af disse dyr til en forværring af dyrenes tilstand?
- 2) ny viden om risikofaktorer (knyttet til såvel soen som transporten) for forværring af dyrenes tilstand i løbet af transporten.

Om muligt skulle projektets resultater omsættes til et værktøj til at vurdere dyrenes egnethed til en given transport før afgang fra besætningen.

Materialer og metoder

Projektets forløb

Projektet er, som planlagt, forløbet med en dataindsamlingsperiode fra januar 2015- februar 2016. For at muliggøre inklusion og transport af måske transportegnede søer blev der indhentet en dyreforsøgstilladelse (Journalnr.: 2015-15-0201-00715), som fritog vognmænd, chauffører og landmænd for det juridiske ansvar for dyrenes transportegnethed. Dette ansvar placeredes i stedet på tilladelsesholderen, projektlederen, som således var ansvarlig for, at søerne på afgangstidspunktet ikke var uegnede til transport. Beslutningen om de enkelte søers deltagelse i forsøget blev truffet på grundlag af den kliniske undersøgelse i besætningen og tilladelsen muliggjorde, at kun søer, som ved denne undersøgelse blev fundet entydigt uegnede jf. Transportforordningen (EU 1/2005), ikke kunne medtages i projektet. Rigspolitiet blev før projektets start orienteret om forsøget og modtog en kopi af tilladelsen.

På trods af dyreforsøgstilladelsen var dataindsamlingen imidlertid, tilsvarende i Delprojekt 2, ikke uden juridiske udfordringer. Baggrunden herfor var, at dyreforsøgslovgivningen overvejende retter sig mod forsøg gennemført under eksperimentelle rammer. Når tilladelseskrævende dyreforsøg, som i dette tilfælde, skal foregå under kommercielle forhold, er der risiko for at Dyreforsøgslovgivningen kolliderer med anden lovgivning på området. I nærværende projekt krævede teksten i tilladelsen derfor flere justeringer og præciseringer for at nå frem til en formulering, der gav mulighed for, indenfor tilladelsens rammer, at gennemføre projektet uden at gøre sig skyldig i overtrædelse af andre love, særligt Dyreværnsloven (LBK nr 1019 af 29/06/2016) og Transportforordningen (EU 1/2005). I sidste ende måtte juridiske myndigheder fastslå, at man i dette tilfælde kunne gøre brug af lex specialis-princippet (se uddybende forklaring under Delprojekt 2). I fremtidige lignende projekter vil det være fordelagtigt tidligt at være opmærksom på sådanne udfordringer.

Undervejs i projektperioden har planer for, status og delresultater fra Delprojekt 3 været præsenteret ved danske såvel som internationale møder, og publiceringen af videnskabelige artikler er i proces. Liste herover ses i Bilag 1.

Design

Undersøgelsen var designet som et observationelt studie (Houe et al., 2004) med frivillig deltagelse fra adspurgte svineproducenter, og besætninger placeret i områder af Danmark, som på forhånd var

kategoriseret efter transporttid til Danish Crowns soslageri i Skærbæk. I undersøgelsen indgik kun konventionelle besætninger.

Besætninger

Information om den forventede transportvarighed mellem danske kommuner og Danish Crowns soslageri i Skærbæk blev stillet til rådighed af Danish Crown, som på forhånd havde inddelt transporttiderne i følgende kategorier (0-2 timer, 2-4 timer, 4-6 timer og 6-8 timer). Indenfor hver kategori valgte vi tilfældigt 6 kommuner, og her indenfor trak vi et postnummer, ligeledes tilfældigt. I hvert af de 24 områder blev potentielle forsøgsbesætninger herefter identificeret via CHR-registeret og Svineflyttedatabasen. Inklusionskriterierne for besætningerne var i) at de leverede søer til Skærbæk Slagteri, og ii) at de leverede gennemsnitligt mindst 8 søer per gang. Indenfor gruppen af potentielt brugbare besætninger valgte vi tilfældigt én per postnummer, som vi kontaktede per brev, og senere telefonisk. Besætningsejerne kunne ikke pålægges at deltage i undersøgelsen, og da der var færre besætninger end forventet, som ønskede at deltage (i alt takkede op mod 80% af de kontaktede svineproducenter nej til at deltage), gennemførte vi endnu en udvælgelse af postnumre. Denne nye pulje af potentielle deltagere blev kun kontaktet telefonisk.

Ved samtale med svineproducenten (ejer/staldmester/fodermester) fik vi mere information om besætningerne. For at fokusere på de mest almindeligt anvendte produktionssystemer havde vi på forhånd valgt at udelade besætninger, der ikke anvendte enten elektronisk sofodring, æde/hvilebokse, vådfodring i langtrug eller gulvfodring i drægtighedsstalden, men alle de interesserede svineproducenter brugte mindst ét af disse systemer. Ved udvælgelsen tog vi desuden hensyn til, om besætningen brugte udleveringsvogn, -rum eller andet, i forsøget på at sikre en ligelig fordeling af besætninger med forskellige udleveringsstrategier. Det viste sig dog, at kun én af de deltagende besætninger brugte udleveringsrum, resten udleveringsvogn. I vores indledende kontakt med svineproducenten indhentede vi oplysninger om besætningens størrelse (antal dyr), frekvens for afhentning af udsættersøer, krav til karantæne, og hvilket vognmandsfirma, som blev benyttet. Ved tilsagn om deltagelse blev besætningens faste vognmandsfirma kontaktet, og hvis de ikke havde indsigelser, kunne besætningen officielt indgå i undersøgelsen. Vi havde forinden afholdt informationsmøder for de største vognmandsfirmaer (Jylland og Fyn), og ingen afslog deltagelse i undersøgelsen, når og hvis vi efterfølgende kontaktede dem. Alle deltagere – såvel svineproducenter som vognmænd og chauffører – blev lovet anonymitet.

Dyr

Søerne, der deltog i undersøgelsen var, som udgangspunkt, besætningernes udsættersøer, og blev udvalgt af svineproducenten. Inklusionskriterierne var, at søerne ikke var uegnede til transport i henhold til Transportforordningen (EU 1/2005), som udelukker ”dyr, som er ude af stand til at bevæge sig ved egen kraft uden smerter eller at gå uden støtte”, ”dyr med alvorligt åbent sår eller en prolaps”, og ”drægtige hundyr, som er mindst 90 % henne i drægtighedsperioden, eller hundyr, som har født inden for den forudgående uge”. Herudover udelukkede vi søer med en kropstemperatur over 40,5 °C.

Beslutningen om det enkelte dyrs mulighed for at deltage i projektet blev som nævnt truffet på grundlag af en grundig klinisk undersøgelse gennemført i besætningen. Såfremt undersøgelsen viste, at en so var entydigt uegnet til transport, og besætningsejeren var uenig, kunne soen ikke indgå i forsøget, men stadig medtages på lastbilen (dog på ejerens/chaufførens ansvar). I tilfælde af tvivl om, hvorvidt en so var entydigt uegnet til transport, indhentede teknikeren veterinær bistand.

Identifikationsoplysninger på alle dyr, som indgik i forsøget, blev påført en attest, der fulgte dyrene fra pålæsning og indtil aflæsningen på slagteriet, og derved tjente som dokumentation for, at vi havde dyreforsøgstilladelse og dermed ansvaret for disse dyrs egnethed til transport.

Udvælgelse af ture

Vores deltagelse i transporter blev planlagt med stor hjælp fra Danish Crowns Ejerservice, som koordinerer alle kommercielle transporter mellem besætninger, transportører og slagteri. På grund af karantæne regler var det kun muligt for os at besøge en besætning per dag, og gennemføre typisk 1-2 ture per uge, altid med mindst én dag imellem. Udvælgelsen af den specifikke transporttur kunne derfor afhænge både af besætningens karantænestatus, turens tidsmæssige placering i forhold til andre ture, og i enkelte tilfælde af besætningens øvrige aktiviteter. Enkelte allerede planlagte ture blev aflyst på selve dagen på grund af problemer med lastbilen eller forhold opstået på slagteriet.

Dataregistrering

Oplysninger fra besætningen per transporttur

Forud for hver transporttur udfyldte svineproducenten et på forhånd udleveret skema med følgende oplysninger om de enkelte søer: udsætterårsag, læg, stadie i reproduktionscyklus (drægtig/lakterende/nyfravænnet/gold), interval mellem beslutning om udsætning og transport til slagteri, opstaldning siden beslutning om udsætning (enkelt/gruppeopstaldning og ±fiksering de sidste 24 timer), hvorvidt soen havde ædt/ikke ædt de sidste 24 timer, og om hun havde fået medicin oghvornår.

Kliniske registreringer (før og efter transport)

De kliniske undersøgelser udførtes af særligt oplærte teknikere fra AU. Teknikerne arbejdede to og to for at muliggøre dataindsamlingen og ankom til besætningen 2-3 timer før søerne enten blev læsset på udleveringsvogn eller flyttet til udleveringsrum. Undersøgelsen blev foretaget i det staldafsnit, hvor soen var opstaldet, før flytningen til udleveringsvogn/-rum, og blev gentaget efter aflæsning på slagteriet i Skærbæk. I alt var der knyttet 4 teknikere til projektet. Det var vores målsætning at det, for hver tur, skulle være samme teknikere der gennemførte undersøgelserne i både besætning og på slagteriet. Der var dog, af praktiske grunde, enkelte tilfælde hvor det kun var den ene af de to, der deltog begge steder.

Undersøgelsen involverede registreringer af mere end 30 forskellige kliniske mål. Forholdene på slagteriet tillod imidlertid ikke at fiksere dyrene, som var urolige efter transporten. Dette betød, ligesom for Delprojekt 2, at en del af de registreringer, som blev gennemført i besætningerne, ikke kunne gentages på slagteriet. Andre registreringer var ikke relevante at gentage, da det drejede sig om mål, som ikke kunne ændre sig i forbindelse med transporten. I Tabel 1 ses listen med kliniske registreringer indsamlet i besætning og på slagteriet, hvor de dele af undersøgelsen, der ikke blev gentaget på slagteriet, er markeret med grå baggrund.

I Bilag 2 findes en nøjere beskrivelse af de enkelte kliniske mål, samt de skemaer som blev anvendt til dataindsamling i besætningerne og på slagteriet.

Tabel 1. Liste over kliniske registreringer i besætning og på slagteriet. Dele af undersøgelsen, der ikke blev gentaget på slagteriet, er markeret med grå baggrund. I besætningen foregik undersøgelsen i tre trin; 1) på afstand; 2) efter at have taget kontakt med den stående so; og 3) under bevægelse. Vejledninger og definitioner til brug af skemaet fremgår af Bilag 2.

Del 1 (på 1-2 meters afstand)		Definitioner
Almenbefindende		Nævn afvigelser
Respirationsfrekvens		Antal per 30 sekunder
Respirationskvalitet		0: normal, 1: anstrengt, 2: overfladisk
Huld		(1-4) brug også halve
Hoved		i) asymmetri (1/0); ii) hævelser (1/0); iii) flåd fra tryne (0, 1, 2)
Hvis soen ligger: Kan hun rejse sig normalt?		0: lå ikke; 1: normalt; 2: ikke normalt
Del 2 (soen står op)		Definitioner
Kropstemperatur		°C, ikke egnet hvis >40,5 °C
Hjerterate		slag per 20 sekunder
Respiration		0: normal; 1: ikke normal
Bugens form og fylde		0: normal; 1: ikke normal
Brok		(1/0), hvis 1: str. (højde/omkreds)
Peristaltik		0: normal; 1: ikke normal (ingen lyd)
Yver	Yverbetændelse	(1/0)
	Opmalkede patter	antal
Afstand fra gulv til nederste patte		cm
Andet		1: hævelser; 2: asymmetri; 3: kronisk yverbetændelse (svamp)
Sår og rifter		antal
Ømhed		(1/0)
Udflåd		1: gennemsigtigt; 2: gult/brunt
Hudens farve		0: alm; 1: bleg; 2: rød; 3: blå (cyanotisk)

Hårlag	0: alm; 1: langt
Sår og skrammer	
Skuldersår	antal og beskrivelse (størrelse (cm), sårskorpe (1/0); blødning (1/0); rødme (1/0); hævelse (1/0); puds (1/0)
Andre sår	antal og beskrivelse (størrelse (cm); sårskorpe (1/0); blødning (1/0); rødme (1/0); hævelse (1/0); puds (1/0)
Skrammer	antal eller ">15" per kropsdel (front, mellem, bagende)
Rødme, hævelse, ømhed	antal områder, tegn ind som punkt eller område (skravér)
Hudens elasticitet	sekunder fra hudflap slippes til den er "væk"
Hudtemperatur	temperatur på lemmer (under knæet) og ører (yderste tredjedel) (varm/kold)
Vulva	
Læsion	(1/0)
Udflåd	(1/0)
Farve på flåd	0: gennemsigtigt; 1: hvidt; 2: gult/brunt
Lugt	(1/0)
Slimhinder (vulva)	
Farve	0: alm. Lyserøde; 1: blege; 2: meget røde; 3: blålige
Tryktest	sekunder til udgangsfarve efter tryk
Ben	
Muskelfylde	0: normal på alle 4 ben; 1: unormal på et ben; 2: unormal på to eller flere ben
Klove og biklove	
Afrevne klove og biklove	0: normale; 1: en afreven klov (hvilken); 2: to eller flere afrevne; 3: beskadigede
Klov- og Biklovlængde	0: normale; 1: for lange
Sår i kronrand	Indtegn på figur og beskriv (som under sår)
Syn	1: normalt; 0: reagerer ikke
Hørelse	1: normalt; 0: reagerer ikke
Del 3 (soen er i bevægelse)	Definitioner
Halthed	Score (0-4)

Læsning og udleveringsvogn

I forbindelse med de 12 første transporter (med i alt 115 søer) blev søerne videooptaget under pålæsning på besætningens udleveringsvogn og igen ved aflæsning på slagteriet, for derved at identificere eventuelle hændelser, der kunne have indflydelse på ændringer i søernes transportegnethed i tidsrummet fra første til anden kliniske undersøgelse. Resultaterne heraf er samlet i en bacheloropgave (Holm, 2015), hvis hovedkonklusion om den meget lave forekomst af sådanne hændelser betød, at denne registrering blev udeladt fra det resterende datasæt.

Hvis der var ventetid efter søerne i udleveringsvognen var blevet kørt til nærmeste offentlige vej og indtil lastbilen ankom, blev søerne filmet under opholdet og deres adfærd analyseret, igen for at få kendskab til eventuelle hændelser i vognen, der ville kunne forklare eventuelle dyrs ankomst til slagteriet i en tilstand som vurderedes at være uegnet til transport.

Følgende oplysninger om besætningernes udleveringsvogne blev registreret: areal, mulighed for skillerum og overdækning. Før hvert ophold blev lastetæthed, anvendelse af skillerum og strøelse noteret, og der blev opsat temperaturloggere (iButton DS1923, Maxim Integrated, San Jose, CA; resolution $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$) i udleveringsvognene. Resultaterne omkring udleveringsvognene hørte som sådan - herunder data omhandlende temperaturen i vognene og søernes adfærd (primært aggressioner og hvile) - ikke direkte under Delprojekt 3s formål og rapporteres derfor ikke her. Resultaterne er imidlertid blevet gjort op, og fremlagt som såvel et masterspeciale (Erichsen og Bonnichsen, 2015) en poster ved en nyligt afholdt kongres (Herskin et al., 2016a) og er submittet til publikation i et videnskabeligt tidsskrift (Herskin et al., 2016b).

Basisoplysninger om hver enkelt lastbil

For hver lastbil, der blev anvendt i undersøgelsen, indhentede vi følgende oplysninger: Hvilket vognmandsfirma den tilhørte, indregistreringsnummer, producent, og separat for hver del af vogntoget: antal etager og rum, samt areal for hvert rum (Data ikke vist).

Oplysninger om hver transport

Danish Crown stillede GPS-data til rådighed, hvilket gav os oplysninger om den præcise distance (km) og varighed (min) af hver transport, antal pauser over 3 minutter og pausernes samlede varighed, tidspunktet for ankomst til slagteriet i Skærbæk, samt hvor længe lastbilen ventede ved slagteriet før søerne blev læsset af. Vi monterede en temperaturlogger (iButton DS1923, Maxim Integrated, San Jose, CA; resolution $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$) i hver lastbil, og målte temperatur og luftfugtighed hvert minut fra tidspunktet, hvor alle søer var læsset på lastbilen til de alle var ude af lastbilen igen. Ved afgang fra besætningen blev dyrenes placering på lastbilen registreret, og ved ankomst til slagteriet, blev vi informeret af chaufføren, hvis søerne var blevet flyttet rundt på vognen undervejs. Ligesom for Delprojekt 2, betød projektets ophæng i kommercielle transporter imidlertid, at disse data viste sig at være for usikre til at kunne indgå.

Bortset fra eventuelle sammenhænge mellem fund af søer der ankom til Skærbæk i en forværret klinisk tilstand og temperaturforholdene under transporterne, så hørte sidstnævnte resultater ikke direkte under Delprojekt 3s formål og rapporteres derfor ikke her. Resultaterne er imidlertid blevet gjort op, og præsenteret ved en nyligt afholdt kongres (Gaillard et al., 2016a) og submittes som publikation i et videnskabeligt tidsskrift (Gaillard et al., 2016b).

Statistik

Alle statistiske analyser blev foretaget i SAS (Version 9.3, SAS Institute Inc., Cary, NC) eller R (R Core Team, 2016). Nedenfor er proceduren for analyserne beskrevet. Flere detaljer fremgår af Bilag 3.

Deskriptiv statistik og indledende analyser

For de variable, der blev målt både før og efter transporten, testede vi, om der var sket ændringer fra første til anden registrering. Ændringen i normalfordelte variable blev testet med en T-test. Ikke normalfordelte og ordinale variable testede vi med en Signed Rank Test, og nominale, ikke-normalfordelte data med en McNemar Test. Hvis der i variable med en nominal fordeling var mere end 2 mulige udfald, testede vi det normale udfald mod de resterende. Værdier for før og efter transport præsenteres nedenfor som enten gennemsnit $\pm$ standardafvigelse (betegnet gns $\pm$ std), median og 25-75 % kvartiler, eller proportionen af søer (%) i de forskellige kategorier.

Analyse af transport- og so-relaterede faktoreres betydning for forværringer i klinisk tilstand efter transport

Hvis der var en signifikant forskel mellem tilstanden i besætningen og på slagteriet, analyserede vi hvilke faktorer, som kunne forklare denne ændring, ved hjælp af en 3-trins analyseprocedure. Hvis ændringen bestod i en forværring for ganske få individer, var en pålidelig analyse imidlertid ikke mulig. Nedenfor beskrives de forskellige trin i analysen.

Trin 1: Til at identificere hvilke variable, der havde betydning for forværringer i de kliniske mål, anvendte vi en simpel variansanalyse, med slagterimålingen som responsvariabel, og de mulige forklarende variable enkeltvis. I denne række af modeller indgik før-værdien målt i besætningen altid som forklarende variabel, og transportdatoen, der også beskriver variation mellem besætninger (da der kun var én tur per besætning per dag) indgik som en tilfældig effekt. De forklarende variable, som i dette indledende trin havde en signifikant effekt ($P < 0,05$), gik videre til analysens næste trin. Alle analyser i Trin 1 blev lavet i R.

Trin 2: De variable, som i den simple analyse i Trin 1, havde signifikant effekt på en eller flere af de kliniske mål, blev inddelt i so- og transport-relaterede faktorer. Vi opstillede derefter to modeller med henholdsvis so- og transportrelaterede responsvariable og analyserede de kliniske mål med begge modeller. Transportmodellen fik desuden tilføjet responsvariable vedrørende temperaturforhold under transport. For ikke-normalfordelte variable brugte vi en generaliseret lineær mixed model (PROC GLIMMIX, SAS), hvor responsvariablen var en binær variabel, der enten angav om den kliniske tilstand var forværret eller ej. De kontinuerte og normalfordelte variable blev både analyseret med en lineær mixed model og med en generaliseret lineær mixed model, som beskrevet ovenfor. I alle modellerne indgik før-værdien for det kliniske mål som responsvariabel, og transportdato som en tilfældig effekt. Responsvariable, undtaget før-værdien, blev trinvist taget ud af modellerne, hvis P-værdien var $> 0,05$.

Trin 3: I det sidste trin valgte vi kun at anvende generaliserede lineære mixed models (PROC GLIMMIX, SAS) og opstillede en model, bestående af de signifikante responsvariable, som blev identificerede i henholdsvis so-faktor og transport-faktor modellerne i Trin 2. Med denne type analyse er det muligt at beregne sandsynligheden (eller odds) for forværringen i de udvalgte kliniske mål. Den endelige model indeholdt følgende forklarende variable: Responsmålets værdi før transport, varigheden af transporten og gennemsnitstemperaturen i lastbilen under transporten samt interaktionen mellem disse, antal stop i transporten med en varighed på mindst 3 minutter, den totale varighed af alle stop på transporten, den maksimale temperatur i lastbilen, antal minutter med temperaturer over 15°C, standardafvigelsen

på temperaturen i lastbilen, gennemsnitstemperaturen under og varigheden af ventetiden før aflæsning på slagteriet samt interaktionen mellem disse, lakterende (ja/nej), paritetsnummer, klovproblemer (ja/nej), vulvaproblemer (ja/nej), kropstemperatur, huldscore og halthedsscore. Transportdatoen indgik som tilfældig effekt. Modellerne blev reduceret ved P-værdier > 0,05, og resultaterne er præsenteret som $\text{Ismeans} \pm \text{Standard Error (SE)}$.

Resultater

I alt indgik 522 søer fra 12 besætninger, og data blev indsamlet fra i alt 47 ture. I gennemsnit var hver besætning udgangspunkt for 3,9 ture, og 3 besætninger bidrog med kun 1 transporttur.

Kun 3 af de 522 deltagende søer ankom til slagteriet i en tilstand, der kunne tyde på uegnethed til transport. En so var ikke i stand til at gå, og de to andre slingrede, hyperventilerede og var tæt på at kollapse.

Besætningsstørrelsen var i gennemsnit 729 dyr (410-1400), inkluderende søer, orner og gylte. Besætningerne fik hentet søer hver eller hver anden uge. Undersøgelsen involverede samarbejde med i alt 7 vognmandsfirmaer.

Transportturen

Ingen af transporterne varede over de tilladte 8 timer. Den gennemsnitlige temperatur i lastbilerne under kørslen til slagteriet var 14,1°C. Alle oplysninger om transporterne fremgår af Tabel 2, opgjort som gennemsnit og variation for en række variable, angivet per so, og dermed beskrivende de gennemsnitlige forhold for den enkelte so under transporten. I Tabel 3 ses de samme variable, nu opgjort per tur.

Tabel 2. Deskriptiv statistik for de 522 søer som indgik i datasættet.

Variabel	Gennemsnit	Std.var	N	Interval
Antal forsøgssøer per tur	11,1			
Varighed (min)	236	144	510	46-469
Afstand (km)	184	106	510	29-386
Antal pauser	2,3	2,3	492	0-7
Varighed af alle pauser (min)	25	29	491	0-172
Ventetid på lastbil efter ankomst til slagteriet (min)	36	22	510	0-135
Gennemsnitlig temperatur (°C)				
hele turen	14,3	5,3	453	3,4-26,1

indtil ankomst	13,7	5,5	444	2,0-25,9
ventetid	16,0	5,3	444	4,7-27,6
Maksimal temperatur (°C)				
hele turen	19,0	4,9	453	7,6-29,1
indtil ankomst	16,7	5,6	444	2,6-29,1
i ventetiden	18,3	5,1	444	7,6-29,1
Antal minutter med > 15°C				
hele turen	128	133	453	0-364
indtil ankomst	109	120	444	0-316
i ventetiden	18	20	444	0-78

Tabel 3. Deskriptiv statistik for de 47 transportture som indgik i datasættet.

Variabel	Gennemsnit	Std.var	N	Interval
Antal forsøgssøer per tur	11,1			
Varighed (min)	235	116	46	46-469
Afstand (km)	179	101	46	29-386
Antal pauser	2,4	2,3	45	0-7
Varighed af alle pauser (min)	27	32	45	0-172
Ventetid på lastbil efter ankomst til slagteriet (min)	36	22	46	0-135
Gennemsnitlig temp. (°C)				
Hele turen	14,1	5,3	40	3,4-26,1
Indtil ankomst	13,5	5,5	39	2,0-25,9
Ventetid	15,7	5,3	39	4,7-27,6
Maksimal temp. (°C)				
Hele turen	18,8	4,9	40	7,6-29,1
Indtil ankomst	16,6	5,6	39	2,6-29,1

I ventetiden	18,0	5,0	39	7,6-29,1
Antal minutter med > 15°C				
Hele turen	117	127	40	0-364
Indtil ankomst	99	114	39	0-316
I ventetiden	18	20	39	0-78

Besætningernes oplysninger om udsættersøerne

Ud fra besætningernes oplysninger fremgår det, at de hyppigste årsager til udsættelse var reproduktionsproblemer, soens alder eller fysiske problemer. I datamaterialet var der 3,3% af søerne, som kun havde fået et kuld, mens 27,8% havde fået over 6 kuld. Disse og de øvrige besætningsoplysninger fremgår af Tabel 4.

Tabel 4. De 12 svineproducenters oplysninger om de 522 søer, som indgik i datasættet.

Information om søerne		Værdi	N
Opstaldning			
Fiksering +/-	Fikseret	51,3	314
	Løs	8,8	
	Ingen data	39,8	
Enkelt/gruppe	Enkelt	56,9	322
	Gruppe	4,8	
	Ingen data	38,3	
Udsætterårsag (%)	Reproduktion	24,5	326
	Alder	22,2	
	Fysisk problem	10,9	
	Andre grunde	4,8	
	Ingen data	37,5	
Antal dage fra besluttet udsat	Gns±std	10,2±8,4	360
Paritet	Median	5	366

	[kvartiler]	[2; 3]	
	Interval 1-11	1-11	
	Kun 1 kuld (%)	3,3	
	> 6 kuld (%)	27,8	
Foderindtag sidste døgn (%)			
	Ja	60,3	315
	Nej	0	
	Ingen data	39,7	
Dage siden tildeling af medicin			
	Gns±std	32,8±35,5	125

Kliniske mål indsamlet i besætningen og efter transport

De kliniske mål, som kun blev registreret i besætningerne, er vist i Tabel 5. Hovedparten af søerne (69,8%) havde en huldscore på 3 eller 3,5, og var derfor hverken for fede eller for magre. Godt 60 % af søerne var ikke-lakterende, og over 90 % havde klove og biklove af normal længde.

Tabel 5. Kliniske mål, der ikke var påvirkelige af transport og derfor kun registreret i besætningerne. For de fleste mål er resultatet angivet som procentdelen af søer i de givne kategorier, og ellers er en anden enhed angivet.

Kliniske mål		Værdi
Klovenes længde (% søer)	N	520
	Normale	92,3
	Lange	7,3
	Ingen data	0,4
Biklovenes længde (% søer)	N	520
	Normale	92,7
	Lange	6,9
	Ingen data	0,4
Huld score (% søer)	N	513
	2	3,5
	2,5	12,1
	3	43,5
	3,5	26,3
	4	12,5
	4,5	0,6
	Ingen data	1,7
Skuldersår (antal søer og str., cm)	N	520
	Skuldersår	47
	Størrelse	
(i alt havde 47 søer)	Median	2,0

<i>skuldarsår, hvoraf 2 søer havde to)</i>	[kvantiler] Interval	[1,5; 2,5] (0,5-5)
Kropsbehåring (% søer)	N	503
	Normal	92,5
	Langhåret	3,8
	Ingen data	3,6
Muskelvolume, ben (% søer)	N	518
	Normal	84,5
	Abnormt på 1 ben	8,8
	Abnormt på flere ben	5,9
	Ingen data	0,8
Brok (% søer)	N	522
	Med brok	0,2
<i>(Kun 1 so, brokposen målte 11x16x18 cm³)</i>	Uden brok	99,4
	Ingen data	0,4
Laktationsstatus (% søer)	N	521
	Lakterende	39,3
	Ikke-lakterende	60,7
Antal opmalkede patter	N	521
	Median	0
	[kvartil]	[0; 11]
	Interval	(0-15)
Komme op selv (% søer)	N	500
	Lå ikke	37,9
<i>Kun registreret, hvis soen ikke stod op ved undersøgelsens start</i>	Normalt	56,1
	Ikke normalt	1,7
Afstand fra patter til gulv (cm)	N	502
	Gns±std	22,7 ± 5,1
	Interval	0-40
Vulva, lugt (% søer)	N	508
	Ingen lugt	96,2
	Lugt	1,0
	Ingen data	2,8
Vulva, udflåd (% søer)	N	519
	Klart	87,6
	Hvidt	11,9
	Gult/brunt	0
	Ingen data	0,6
Hjerterate (slag/20sek)	N	474
	Gns±std	24,6±5,8
	Interval	(12-62)

Tabel 6 angiver resultater for de kliniske mål, hvor ændring var mulig som følge af transport, men hvor der ikke fandtes ændring.

Tabel 6. Kliniske mål, der kunne ændres under transport, men som ikke ændrede sig. Resultatet for de fleste variable er angivet som procentdelen af søer i de givne kategorier, og ellers er en anden enhed angivet.

Klinisk mål		Besætning	Slagteri	Statistik
Almenbefindende (% søer)	N	513	459	P > 0,1250
	godt	97,3	87,9	
	dårlig	1,0	0	
	ingen data	1,7	12,1	
Hudfarve (% søer)	N	517	502	P > 0,1797
	0	97,9	95,8	
	1	0,8	0,2	
	2	0,4	0,2	
	ingen data	1,0	3,8	
Kropstemp. (°C)	N	512	493	P = 0,5484
	gns±std	37,9 ± 0,7	37,9 ± 0,8	
	interval	(33,2-40,4)	(28,1-41,7)	
Hudtemperatur på lemmer (% søer)	N	516	502	P = 0,1495
	kold	23,4	19,5	
	varm	75,5	76,6	
	ingen data	1,1	3,8	
Hovedets facon (% søer)	N	520	504	P = 0,5637
	normal	99,2	94,4	
	assym/hævet	0,4	0,2	
	ingen data	0,4	3,5	
Flåd fra tryne (% søer)	N	521	282	Ingen analyser pga. utilstrækkeligt data
	Intet flåd	99,6	54,0	
	Klart	0,3	0	
	Grønt	0	0	
	Ingen data	0,2	46,0	
Bugens facon (% søer)	N	518	495	P = 1,0000
	normal	99,0	94,8	
	abnorm	0,2	0	
	ingen data	0,8	5,2	
Slimhindetryktest (sek)	N	517	508	P = 0,4559
	median	3	3	
	[kvartiler]	[3; 3]	[3; 3]	
	Interval	(0-3)	(0-5)	
Slimhindefarve ¹ (% søer)	N	519	511	P = 0,0956
	normal	95,4	92,0	
	lyserød	1,7	1,5	
	bleg	1,9	4,0	
	meget rød	0,4	0,2	
	ingen data	0,6	2,1	
Yverbetændelse (% søer)	N	519	281	P = 0,1317
	0	95,4	52,9	
	1	4,0	1,0	
	ingen data	0,6	46,2	
Yverømhed (% søer)	N	517	495	P = 0,6547
	0	97,7	93,9	
	ømhed	1,3	1,0	
	ingen data	(7 dyr, 4 flåd) 1,0	(5 dyr, 3 flåd) 5,2	
Andre yverproblemer (% søer)	N	521	492	P = 0,5994
	ingen	83,1	77,6	
	yverbet.	3,4	3,1	
	assym. yver	11,5	12,1	
	kronisk yverbet.	2,5	3,4	
	ingen data	0,2	5,6	
Sår i kronrand (% søer)	N	516	502	P = 1,0000
	0	98,7	96,0	
	mindst 1	0,2	0,2	
	ingen data	1,2	3,8	

En stor andel af de kliniske mål, der ændrede sig under transport var skader, som var opstået undervejs, såsom sår, forværring af halthed og andre læsioner (Tabel 7). Ved måling af hudens elasticitet, var hudflappen længere om at falde på plads, som et udtryk for en øget grad af dehydrering efter transport. De mål, der i Tabel 7 er markeret med *, blev yderligere analyseret for at identificere om og hvilke so- og transportrelaterede faktorer, der havde effekt på ændringen i søernes tilstand ved ankomsten til slagteriet.

Tabel 7. Kliniske mål, der ændrede sig under transport. Resultatet for de fleste variable er angivet som procentdelen af søer i de givne kategorier. Hvis ikke, så er anden enhed givet.

Klinisk mål		Besætning	Slagteri	Statistik
Respirationskvalitet (% søer)	N	518	498	P = 0,0218 ³
	normal	97,9	92,2	
	tvungen	0,6	1,3	
	overfladisk	0,8	1,9	
	ingen data	0,8	4,6	
Respirationsfrekvens	N	508	499	P < 0,001
	median	16	18	
	[kvartiler]	[13,5; 21]	[14; 23]	
	interval	(7-42)	(6-69)	
Hudtemperatur, ører (% søer)	N	520	509	P < 0,001
	kold	42,3	14,8	
	varm	57,3	82,8	
	ingen data	0,4	2,5	
Hudelasticitet (sek.)*	N	508	506	P < 0,001
	median	3	3	
	[kvartiler]	[2; 3]	[3; 4]	
	interval	(1-6)	(1-9)	
Antal hævelser på kroppen*	N	519	507	P < 0,001
	median	0	0	
	[kvartiler]	[0; 0]	[0; 1]	
	interval	(0-4)	(0-5)	
Afrevne klove (% søer)	N	518	497	P = 0,0156
	0	98,7	95,2	
	mindst 1	0,6	1,7	
	ingen data	0,8	3,1	
Antal sår*	N	520	514	P < 0,001
	median	1	2	
	[kvartiler]	[0; 2]	[1; 3]	
	interval	(0-7)	(0-13)	
Antal skrammer, total ^{1*}	N	522	509	P < 0,001
	median	0	6	
	[kvartiler]	[0; 1]	[2; 12]	
	interval	(0-45)	(0-45)	
Antal skrammer, front ^{2*}	N	520	509	P < 0,001
	median	0	3	
	[kvartiler]	[0; 0]	[1; 7]	
	interval	(0-0)	(0-15)	
Vulvalæsioner (% søer)	N	520	500	P < 0,001
	ingen	92,3	80,3	
	1 eller mere	7,3	15,5	
	ingen data	0,4	4,2	
Antal sår på yveret	N	514	498	P = 0,0267
	median	0	0	
	[kvartiler]	[0; 1]	[0; 1]	
	interval	(0-7)	(0-8)	
Halthedsscore (% søer)*	N	508	509	P < 0,001
	0	87,0	78,9	
	1	9,6	17,1	

2	0,8	1,3
3	0	0,2
ingen data	2,7	2,5

¹Der blev registreret max 45 skrammer, derfor er "45" = mindst 45 skrammer

²Der blev registreret max 15 skrammer, derfor er "15" = mindst 15 skrammer


³Testet om respirationskvalitet er forskellig fra normal

*Variable, hvor effekten af so- og transportfaktorer er yderligere analyseret

Effekt af transport- og so-relaterede faktorer på forværring i søernes tilstand ved ankomst til slagteriet

Skrammer


Sandsynligheden for, at søerne havde fået flere skrammer på kroppen under transporten var påvirket af en interaktion mellem den gennemsnitlige temperatur i lastbilen og varigheden af transporten ($F_{3,405}=8,44$; $P<0,001$; Figur 1). Meget høje og meget lave gennemsnitstemperaturer gav således den højeste risiko for flere skrammer på de korteste transporter. Mens risikoen faldt med stigende transportvarighed ved temperaturer under $6,5^{\circ}\text{C}$, var den imidlertid fortsat høj ved temperaturer over 18°C . Ved temperaturer mellem $6,5$ og 18°C var risikoen signifikant lavere på de kortere ture, men steg med transportvarigheden ved temperaturer i intervallet 13 - 18°C . Stigningen i antal skrammer var ligeledes påvirket af en interaktion mellem varigheden af ventetiden i lastbilen inden aflæsning på slagteriet og temperaturen i lastbilen i denne periode ($F_{3,405}=6,61$; $P=0,001$). Ved temperaturer under $6,5^{\circ}\text{C}$ steg risikoen for skrammer således jo længere søerne ventede, mens det omvendte var tilfældet i temperaturintervallet fra 13 - 18°C . Ved temperaturer mellem $6,5$ og 13°C var risikoen for skrammer høj, uanset ventetidens varighed.



Figur 1. Sandsynligheden for at få flere skrammer under transport ved forskellige intervaller for gennemsnitstemperaturen i lastbilen. Estimer for sandsynligheden er udregnet for transporttider af 100, 200, 300 og 400 minutters varighed.

Ikke-lakterende søer havde 2,6 gange så høj risiko for at få flere skrammer sammenlignet med lakterende søer ($F_{1,405}=7,96$; $P<0,01$), og søer der ved afgang havde en vulvalæsion, udflåd eller andre problemer relateret til vulva, havde næsten 3 gange så stor risiko for at have fået flere skrammer ved ankomsten til slagteriet ($F_{1,405}=4,01$; $P<0,05$). Hvis den totale varighed af pauser under transporten oversteg 30 minutter, var der over 8 gange så høj sandsynlighed for flere skrammer ($F_{2,405}=6,26$; $P<0,01$). Hvis søerne havde få skrammer inden afgang var sandsynligheden derudover større for, at de havde fået flere ved ankomst til slagteriet ($F_{1,405}=12,79$; $P<0,001$).

Ændringen i antal skrammer på søernes forpart blev, udover at indgå i ovenstående resultater, også analyseret særskilt. Her var risikoen for flere skrammer ligeledes påvirket af en interaktion mellem den gennemsnitlige temperatur i lastbilen og transportens varighed ($F_{3,423}=6,16$; $P<0,001$; Figur 2). Ved de højeste og laveste transporttemperaturer, var risikoen generelt høj, uanset transportens varighed. Ved transportvarigheder over gennemsnittet var risikoen generelt høj, og ikke påvirket af temperaturen.



Figur 2. Sandsynligheden for at få flere skrammer på forparten under transport ved forskellige intervaller af gennemsnitstemperaturen. Estimer for sandsynligheden er udregnet for transporttider på 100, 200, 300 og 400 minutters varighed.


Stigningen i antal skrammer på forparten var ligeledes påvirket af en interaktion mellem varigheden af ventetiden i lastbilen inden aflæsning og temperaturen i lastbilen i venteperioden ($F_{3,423}=2,70$; $P<0,05$). Ved temperaturer under 13°C var risikoen for skrammer generelt høj, og ved højere temperatur steg risikoen med øget ventetid før aflæsning. Ikke-lakterende søer havde lidt over dobbelt så stor risiko for flere skrammer ved ankomsten til slagteriet ($F_{1,423}=6,87$; $P<0,01$), og søer der ved afgang havde en vulvalæsion, udflåd eller andre problemer relateret til vulva, havde næsten 3 gange så stor risiko for at have fået flere skrammer ved ankomst til slagteriet ($F_{1,423}=5,57$; $P<0,05$). Hvis søerne havde få skrammer på forparten inden afgang var sandsynligheden desuden større for, at de havde fået flere ved ankomsten til slagteriet ($F_{1,423}=17,41$; $P<0,001$).

Sår

Sandsynligheden for at søerne fik flere sår under transporten var påvirket af gennemsnitstemperaturen under transport ($F_{3,423}=4,68$; $P<0,01$). Risikoen var lavest ved temperaturer over 18°C (sandsynligheden for flere sår i temperaturintervallerne var: $<6,5^{\circ}\text{C}$: $0,71\pm 0,08$; $6,5-13^{\circ}\text{C}$: $0,75\pm 0,05$; $13-18^{\circ}\text{C}$: $0,53\pm 0,05$; $>18^{\circ}\text{C}$: $0,26\pm 0,07^{\circ}\text{C}$). Herudover steg risikoen med øget ventetid på slagteriet, således at en forøgelse på 10 minutter medførte en øget risiko på 13 % ($F_{1,423}=5,06$; $P<0,05$). Hvis søerne havde få sår inden afgang, var sandsynligheden større for, at de havde fået flere ved ankomst til slagteriet ($F_{1,423}=5,45$; $P<0,05$).

Hævelser og rødmen på kroppen


Søerne have en større sandsynlighed for at få flere hævelser og områder med rødme, jo længere tid lastbilen holdt stille på vej til slagteriet ($F_{2,481}=15,80$; $P<0,001$; Figur 3). Derimod var risikoen lavere jo flere gange bilen holdt stille ($F_{1,481}=18,23$; $P<0,001$), idet sandsynligheden for flere hævelser faldt med $26,2\pm 1,1\%$ for hver gang lastbilen stoppede. Risikoen for hævelser og rødme var ikke påvirket af om soen allerede havde hævede eller røde områder ved undersøgelsen i besætningen ($P=0,93$).



Figur 3. Sandsynligheden for at få flere hævelser og/eller områder på kroppen med rødme ved forskellige intervaller af den totale varighed af pauser under transport.

Hudelasticitet som mål for dehydrering

Hudelasticiteten faldt, som muligt tegn på dehydrering, hvis den gennemsnitlige temperatur i lastbilen under transporten var over 18°C ($F_{3,423}=8,12$; $P<0,001$; Figur 4). Elasticiteten var endvidere påvirket af turens varighed (sandsynligheden for forværring for intervaller af varigheder: <115 min: $0,22\pm 0,06$; $115-235$ min: $0,26\pm 0,05$; $235-325$ min: $0,50\pm 0,07$; >325 min: $0,17\pm 0,04$; $F_{3,423}=4,89$; $P<0,05$). Det var ture i intervallet fra 235-325 minutter, som resulterede i den højeste risiko for nedsat hudelasticitet, sammenlignet med de øvrige varighedskategorier (alle $P<0,05$). Hvis soens hudelasticitet var lav inden transporten var risikoen for en forværring mindre ($F_{1,423}=66,84$; $P<0,001$).



Figur 4. Sandsynligheden for nedsat hudelasticitet hos slagtesøerne ved forskellige intervaller for gennemsnitstemperaturen i lastbilen under transport.

Halthed

Søernes risiko for at blive halte eller mere halte, var uafhængig af halthedsgraden før afgang til slagteriet ($F_{2,462}=2,18$; $P=0,11$). Søer med klovproblemer havde 3 gange så stor risiko for at blive mere halte under transporten, som søer uden klovproblemer ($F_{1,462}=6,83$; $P<0,01$). Endvidere viste resultaterne, at hvis ventetiden i lastbilen inden aflæsning på slagteriet blev forlænget med 10 minutter, var der 22 % højere risiko for, at søerne var halte eller mere halte ved den kliniske undersøgelse på slagteriet ($F_{1,462}=9,84$; $P<0,01$).

Diskussion

Dette projekt er det største af sin art til dato på verdensplan, involverer data fra 522 søer, og har genereret ny viden om risikoen for forværring af slagtesøers kliniske tilstand, og dermed for graden af belastning og dyrenes transportegnethed, efter transport til slagteri under kommercielle, danske forhold. For en betragtelig del af de involverede kliniske mål var der tale om forværring af søernes tilstand i perioden mellem de to kliniske undersøgelser. Resultaterne viser derfor tydeligt, at søers kliniske tilstand blev forværret under transport til slagteri. Analyserne af de forskellige risikofaktorer viser, at det i højere grad var karakteristika ved transporten (såsom dens varighed og varigheden af pauser i kørslen samt ventetid på slagteriet) som i vekselvirkning med temperaturen i lastbilen under transporten, var forbundet med øget risiko for forværring af søernes tilstand under transport, end det var de so-relaterede faktorer. Ud af de 522 dyr i datasættet ankom kun 3 til slagteriet i en tilstand, der kunne tyde på uegnethed jævnfør dansk praksis. Dette lave antal betyder, at projektets resultater ikke kunne omsættes til et værktøj til på forhånd at udpege dyr der ville, eller var i meget høj risiko for at, ankomme til slagteriet som uegnede til transport. Resultaterne kan imidlertid i høj grad benyttes i praksis til for eksempel at opstille anbefalinger eller retningslinjer for transport af slagtesøer, som vil

være til gavn for dyrenes velfærd, og derved kunne medvirke til at lette branchens arbejdsvilkår samt myndighedernes kontrolindsats.

I hverken Delprojekt 2 eller 3 ankom ret mange dyr til slagterierne i en tilstand som var problematisk jf. nuværende praksis omkring transportegnethed, men bortset fra dette, var der tydelige forskelle i resultaterne fra de to delprojekter. Eksempelvis viser Delprojekt 3s analyser af de forskellige risikofaktorer tydeligt, at det i højere grad var karakteristika ved transporten (såsom dens varighed, varigheden af pauser under kørslen og ventetid på slagteriet) som i vekselvirkning med temperaturen i lastbilen under transport, var forbundet med øget risiko for forværring af søernes kliniske tilstand som følge af transporten til slagteri. Det er dog ikke givet, at eksempelvis varigheden af transporten i sig selv er kausal for den observerede forværring, men når varigheden af en transport øges under bestemte forhold (f.eks. høj temperatur) kan dyrenes tilstand forværres. Fremtidige undersøgelser, som inddrager mulighed for intervention og standardiseret brug af forskellige transporttider, er nødvendige for endeligt at afklare disse forhold. Da dataindsamlingen i delprojektet var baseret på frivillig deltagelse af private svineproducenter og bistand fra transportfirmaer, var der et naturligt sammenfald mellem de enkelte besætninger og afstanden til slagteriet. Hvis effekten af transportvarighed, som tilsyneladende er væsentlig for slagtesøers tilstand ved ankomsten til slagteriet, skal undersøges systematisk, bør dette gøres i et eksperimentelt design, som vil muliggøre den korrekte adskillelse af effekter af besætninger og afstand.

At temperaturen i lastbilerne var af betydning for dyrenes risiko for at komme frem i forværret tilstand var ikke uventet, idet det er velkendt at svin, blandt andet pga. deres meget reducerede svedkirtler og deraf følgende behov for adfærdsmæssig termoregulering, er følsomme overfor varmemstress. Indtil nu har man imidlertid kun haft viden om temperaturfølsomhed under transport fra slagtesvin (Averos et al., 2008; Gajana et al., 2013). Viden om søers følsomhed overfor varmemstress kommer primært fra staldforhold, men viser ikke overraskende at disse store dyr, og især i perioder hvor de lakterer, tåler varmepåvirkning dårligere end slagtesvin (Barb et al., 1991). Resultaterne af Delprojekt 3 bekræfter dette under transportforhold, idet flere af de mål, der forværredes under transporten, var negativt påvirkede af stigende temperaturer. Samtidig var søernes hudelasticitet lavere på slagteriet sammenlignet med inden transporten, hvilket indikerer en stigning i dyrenes dehydreringsgrad. Endelig viste resultaterne, at dehydreringsgraden steg hvis gennemsnitstemperaturen under transporten var over 18°C.

Risikoen for at få flere skrammer under transport, både totalt på hele kroppen men også på forparten, (som særligt associeres med aggression (Turner et al., 2006)), var generelt højere, hvis gennemsnitstemperaturen var høj og i kombination med lange transportvarigheder steg risikoen selv ved mere moderate temperaturer. Dette kan være et udtryk for at søerne slås undervejs til slagteriet i forsøget på at kunne benytte adfærd til at termoregulere (f.eks. at ligge ned eller flytte sig til et køligere område i lastbilen). Ved gennemsnitstemperaturer under 6,5°C i lastbilerne var der imidlertid også en øgning i det totale antal skrammer, dog især på kortere ture, hvilket kan tyde på et højere aktivitetsniveau ved lavere temperaturer (samt at temperaturen typisk vil stige med en øget transportlængde). Når der ses isoleret på sandsynligheden for flere skrammer på forparten, er der ingen forskel i risikoen for flere skrammer som funktion af temperaturen på lange transporter, hvilket indikerer at aggressionsniveauet og typen af aggressioner måske ændrer sig på lange ture, idet aggressioner på forparten typisk associeres med gensidig aggression, i modsætningen til mere ensidige konfrontationer, hvor den ene so fordrives/fortrænges (Turner et al., 2006).

At såvel forværringen af den gennemsnitlige kliniske tilstand, og sandsynligvis også tilstanden hos mindst 2 af de 3 søer, som ankom til Skærbæk i meget dårlig stand (2 ud af de 3 blev transporteret på en varm sommerdag), hang sammen med temperaturen i lastbilen under transporten, betyder at ændringer i praksis omkring transport af søer til slagtning på varme dage formodentlig vil kunne have en ikke ubetydelig velfærds-mæssig effekt. Præcis hvilke tiltag der vil virke, og det nøjagtige omfang af effekterne heraf kræver yderligere undersøgelser, men allerede på kort sigt vil det være muligt at iværksætte tiltag såsom at begrænse kørsel med søer i de varmeste timer af døgnet på varme dage, eller især på varme dage at søge at reducere ventetiden i lastbilen før aflæsning på slagteriet. Herudover vil resultaterne af Delprojekt 3 kunne danne grundlag for en fremadrettet strategisk prioritering af en systematisk forsknings- og udviklingsindsats. Kun ved tilvejebringelse af viden på området kan rutiner, procedurer og faciliteter, såsom for eksempel lastetæthed, gulvtyper, skillerum, ventilation, anden mulighed for afkøling og disses vekselvirkninger, optimeres og dyrenes velfærd dermed fremmes. På længere sigt vil tildeling af særlige forhold til søerne åbne mulighed for eksempel mærkningsordninger eller lignende som kan dokumentere at dyrene bliver kørt under forhold, der i særlig grad tilgodeser deres velfærd.

Resultaterne fra Delprojekt 3 viser, at karakteristika ved soen såsom huld eller læg, som ellers er lette for landmanden at genkende før afgang fra besætningen, kun havde mindre betydning for forværringen af dyrenes kliniske tilstand. Dette betyder, at det formodentlig – i modsætning til resultaterne af Delprojekt 2 – for de fleste af de kliniske mål vil være vanskeligt at opstille effektfulde retningslinjer baseret på dyrenes tilstand før afgang. Generelt var den enkelte søs tilstand før transport en dårlig indikator for tilstanden ved ankomst til slagteriet. Typisk havde før-tilstanden i de forskellige kliniske mål signifikant betydning for graden af forværring, men kun således, at en god tilstand, som for eksempel få skrammer medførte øget sandsynlighed for en forværring. Dette tyder derfor ikke på, at det var søer i en allerede dårlig tilstand, der havde en forøget risiko for at blive mindre transportegnede undervejs til slagteriet transport, måske endda tværtimod.

Delprojekt 3 involverede et begrænset antal observationer af søer i udleveringsvogne (data ikke inkluderet i denne rapport). På trods heraf, tyder resultaterne på at et sådant ophold kan være forbundet med reduceret velfærd for dyrene. På verdensplan er brugen af udleveringsvogne til afsendelse af søer til slagtning en relativt ny praksis, som gennemføres af hensyn til smittebeskyttelse. Den velfærds-mæssige betydning for søerne, og for deres egnethed til den efterfølgende transport, har ikke været genstand for systematiske undersøgelser. Hvis større, fremtidige undersøgelser kan bekræfte resultaterne fra Delprojekt 3, så kan der stilles spørgsmålstejn ved den gældende praksis, hvor dyrene må opholde sig i op til 2 timer i en udleveringsvogn uden at dette tidsrum medregnes i transporttiden.

I såvel Delprojekt 2 som 3 var det en målsætning at lave registreringer af dyrenes adfærd under selve transporten for på den måde at få viden om hvorvidt det var her, og i givet fald hvordan, dyrenes tilstand blev forværret, eventuelt til en grad, hvor de var uegnede til videre transport. Pga. tekniske udfordringer forbundet med indsamling af videodata under kommerciel svinetransport lykkedes dette dog ikke i Delprojekt 3. Resultaterne af Delprojekt 3, hvor søernes tilstand ofte forværredes under transporten, kalder imidlertid på fremtidige undersøgelser under såvel kørsel som under pauser i kørslen. Delprojekt 3 viste, at når den totale varighed af pauser i transporten oversteg 30 minutter, så var der 8 gange så stor risiko for at søerne fik flere skrammer – som er et indirekte mål for aggression

og slagsmål - og risikoen for at søerne ankom med flere hævelser og rødme på kroppen steg ligeledes. Fremtidige studier, som sammenligner adfærd hos søer under henholdsvis kørsel og pauser, er nødvendige for at afklare dette, og for dermed at sikre, at transporterne i videst mulige omfang tager hensyn til dyrenes velfærd.

Et element af sotransport, som blev synligt under projektet, er ophold på slagteriet, især i forbindelse med ventetid før aflæsning og eventuel overnatning på slagteriet efter det levende syn. Sidstnævnte er ikke omfattet af transportegnethedsproblematikken, da dyrene er ankommet til slagteriet. Resultaterne fra Delprojekt 3 viser imidlertid, at lastbilerne ventede i relativt lange, og relativt variable perioder, før søerne blev læsset af, og at risikoen for forværring i graden af haltheds steg med længere ventetider. Temperaturen i lastbilen i ventetiden havde betydning for flere af de kliniske måls grad af forværring, og lave gennemsnitstemperaturer betød forøget risiko for at søerne fik flere skrammer, selv ved korte ventetider, måske fordi søerne ikke var varmebelastede og derfor havde mere energi til at indgå i rangkampe. For at sikre slagtesøer så lav belastning i forbindelse med transport til slagt som muligt, er der derfor behov for yderligere undersøgelser, som fokuserer på denne fase af transporten. Overnatning på slagteriet har ikke indgået i Delprojekt 3, men kan i et vist omfang praktiseres for søers vedkommende, og er sandsynligvis et velfærdsproblem. Der er derfor brug for flere undersøgelser, som kortlægger denne praksis og dens velfærds-mæssige betydning.

Konklusion

Dette projekt er det største af sin art på verdensplan hidtil og har genereret ny viden om risikoen for forværring af den kliniske tilstand hos slagtesøer (og dermed deres transportegnethed) efter transport til slagteri under kommercielle, danske forhold. Samlet viser Delprojekt 3, at slagtesøers kliniske tilstand forværres under transport, dog sjældent i en grad, så de ville være blevet vurderet som uegnede (jævnfør nuværende praksis) til transport ved ankomsten til slagteriet. Blandt de væsentligste risikofaktorer for den kliniske forværring er karakteristika ved transporten, og i mindre grad karakteristika ved søerne. Projektets resultater kan benyttes til at opstille anbefalinger eller retningslinjer for transport af slagtesøer. Sådanne vil på kort sigt kunne implementeres i praksis og være til gavn for såvel dyrenes velfærd som branchens arbejdsvilkår og myndighedernes mulighed for kontrol. Endvidere kan projektets resultater, tilsvarende Delprojekt 2, danne grundlag for fremadrettet forskning og udvikling af såvel nye managementrutiner, faciliteter og procedurer – på tværs af såvel branche som myndigheder - som vil kunne reducere velfærdsbelastningen forbundet med transport for disse dyr og lette arbejdsgange forbundet med vurderingen af dyrenes transportegnethed.

Referencer

Averos X, Knowles TG, Brown SN, Warriss PD, Gosálvez LF. 2008. Factors affecting the mortality of pigs being transported to slaughter. *Veterinary Record* 163: 13, s.386-390.

Barb CR, Estienne MJ, Kraeling RR, Marple DN, Rampacek GB, Rahe CH, Sartin JL. 1991. Endocrine changes in sows exposed to elevated ambient temperature during lactation. *Domestic Animal Endocrinology* 8: 117-127.

De Hollander CA, Knol EF, Heuven HCM, van Grevenhof EM. 2015. Interval from last insemination to culling: II. Culling reasons from practise and the correlation with longevity. *Livestock Science* 181: 25-30.

- de Jong E, Appeltant R, Cools A, Beek J, Boyen F, Chiers K, Maes D. 2014. Slaughterhouse examination of culled sows in commercial pig herds. *Livestock Science* 167: 362-369.
- Engblom L, Lundeheim N, Dalin, A-M, Andersson K. 2007. Sow removal in Swedish commercial herds. *Livestock Science* 106: 76-86.
- Erichsen D, Bonnichsen M. 2015. Adfærd og velfærd hos udsættersøer i forbindelse med ophold på udleveringsvogn. Masterspeciale, MVHP, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, 32 sider.
- Gaillard C, Fogsgaard KK, Thodberg K, Herskin MS. 2016a. Variation of a temperature-humidity index in the truck transporting sows to slaughter. I ESLAV-ECLAM Annual Scientific Meeting on Animal Welfare, Nov 14-17, Lyon, Frankrig.
- Gaillard C, Fogsgaard KK, Thodberg K, Herskin MS. 2016b. Variation of a temperature-humidity index in the truck transporting sows to slaughter (under udarbejdelse).
- Gajana CS, Nkukwana TT, Marume U, Muchenje V. 2013. Effects of transportation time, distance, stocking density, temperature and lairage time on incidences of pale soft exudative (PSE) and the physico-chemical characteristics of pork. *Meat Science* 95: 520-525.
- Grandin T. 2016. Transport fitness of cull sows and boars: A comparison of different guidelines on fitness for transport. *Animals* 6: 77; doi:10.3390/ani6120077.
- Herskin MS, Fogsgaard KK, Erichsen D, Bonnichsen M, Gaillard C., Thodberg K. , 2016a. Housing of culled sows in the hours before transport to the abattoir – description of sow behavior while waiting in a pick-up vehicle. I ESLAV-ECLAM Annual Scientific Meeting on Animal Welfare, Nov 14-17, Lyon, Frankrig.
- Herskin MS, Fogsgaard KK, Erichsen D, Bonnichsen M, Gaillard C, Thodberg K. 2016b. Housing of cull sows in the hours before transport to the abattoir – description of sow behaviour while waiting in a pick-up vehicle. (Submittet til *Animals*, november 2016).
- Holm C. 2015. Effekt af halthed og transportvarighed på søers adfærd på rampen. Bachelorprojekt, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, 29 sider.
- Houe H, Ersbøll AK, Toft N. 2004. Introduction to Veterinary Epidemiology. Biofolia, Frederiksberg C. 398 sider.
- Knauer M, Stalder KJ, Karriker L, Baas TJ, Johnson C, Serenius T, Layman L, McKean JD. 2007. A descriptive survey of lesions from cull sows harvested at two Midwestern U.S. facilities. *Preventive Veterinary Medicine* 82: 198-212.
- McGee M, Johnson AK, O'Connor AM, Tapper KR, Millman ST. 2016. An assessment of swine marketed through buying stations and development of fitness for transport guidelines. *Journal of Animal Science* 16, 94, Suppl. 2: 9.
- Nielsen BL, Dybkjær L, Herskin MS. 2011. Road transport of farm animals: effects of journey duration on animal welfare. *Animal* 5: 415-427.
- OIE World Organization for Animal Health. 2016. Terrestrial Animal Health Code, <http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/> tilgængeligt online Okt 2016).
- R Core System. 2016. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.

Turner SP, Farnworth MJ, White IMS, Brotherstone S, Mendl M, Knap P, Penny P, Lawrence AB. 2006. The accumulation of skin lesions and their use as a predictor of individual aggressiveness in pigs. *Applied Animal Behaviour Science* 96: 245–259.

Zhao Y, Liu X, Mo D, Chen Q, Chen Y. 2015. Analysis of reasons for sow culling and seasonal effects on reproductive disorders in Southern China. *Animal Reproduction Science* 159: 191-197.




Foto: Inger Anneberg, AU

Relevante offentliggørelser relateret til Delprojekt 3 under forskningsprojektet ”Vurdering af dyrs transportegnethed”

Erichsen D, Bonnichsen M. 2015. Adfærd og velfærd hos udsættersøer i forbindelse med ophold på udleveringsvogn. Masterspeciale, MVHP, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, 32 sider.

Fogsgaard KK, Thodberg K, Herskin MS. 2016. Effects of transport on the clinical condition of sows destined for slaughter. Delresultater præsenteret ved den 50. internationale ISAE kongres, Edinburgh, Scotland, 12-16 juli.

Gaillard C, Fogsgaard KK, Thodberg K, Herskin MS. 2016a. Variation of a temperature-humidity index in the truck transporting sows to slaughter. I Proceedings of the ESLAV-ECLAM Annual Scientific Meeting on Animal Welfare, Lyon, Frankrig, 14-17 november.

Gaillard C, Fogsgaard KK, Thodberg K, Herskin MS. 2016b. Variation of a temperature-humidity index in the truck transporting sows to slaughter (in preparation).

Herskin MS, Fogsgaard KK, Erichsen D, Bonnichsen M, Gaillard C, Thodberg K. , 2016a. Housing of culled sows in the hours before transport to the abattoir – description of sow behavior while waiting in a pick-up vehicle. I Proceedings of the ESLAV-ECLAM Annual Scientific Meeting on Animal Welfare, Lyon, Frankrig, 14-17 november.

Herskin MS, Fogsgaard KK, Erichsen D, Bonnichsen M, Gaillard C, Thodberg K. 2016b. Housing of cull sows in the hours before transport to the abattoir – description of sow behaviour while waiting in a pick-up vehicle. (Submittet til et special issue af Animals omhandlende transport af svin, november 2016).

Holm C. 2015. Effekt af halthed og transportvarighed på søers adfærd på rampen. Bachelorprojekt, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, 29 sider.

Thodberg K, Fogsgaard KK, Putzer A, Bonnichsen M, Erichsen D, Herskin MS. 2015. Are sows sent for slaughter fit for transport? Forsøgsdesign præsenteret ved Symposium of the Humane Slaughter Association, Zagreb, Croatia, 15-16 juli.

Klinisk undersøgelse af søer i transportprojektet (besætning)

Besætning:

Sonr:

Sted: Besætning

Tidspunkt:


Kroppen opdeles i 3 dele: Front (fra tryne til bag skulder), mellemdel (fra bag skulder til hvor låret starter), og bagende.

Del 1: Almen tilstand (inden soen kontaktes på 1-2 meters afstand)

Område/funktion	Parameter	Score/bemærkning
Almenbefindende	Nævn afvigelser	
Respirationsfrekvens	Antal per 30 sekunder	
Respirationskvalitet	0: normal, 1: anstrengt, 2: overfladisk	
Huld*	(1-4) brug også halve	
Hoved	i) Asymmetri eller hævelser(1/0)	
	iii) Flåd fra tryne (0, 1, 2)	
Hvis soen ligger: Kan hun rejse sig op normalt?	Lå ikke: 0, Normalt: 1, ikke normalt: 2 Vær opmærksom på evt. prolaps(synlig slimhinde)	

Del 2: (mens soen er fikseret)

Område/funktion	Parameter	Score/bemærkning
Kropstemperatur	°C	>40,5: må ikke transporteres
Hjerterate	Slag per 20 sekunder	
Respiration(lyt på begge sider)	Normal: 0, Ikke normal: 1	
Bugens form og fylde	i) Normal: 0, Ikke normal: 1	
	ii) Brok (1(/0), hvis 1: str.	højde: omkreds:
	iii) Peristaltik, normal: 0, ikke normal (ingen lyd): 1	
Yver	Yverbetændelse: 1, ellers 0	
	Antal opmalkede patter på hver side	H: V:
	Afstand fra gulv til nederste patte (cm)	
	Hævelser: 1, asymmetri: 2, kronisk yverbetændelse (svamp): 3	
	Antal sår og rifter	
	Ømhed: 1, udflåd: 2 (1: gennemsigtigt, 2: gult/brunt)), ingen af delene: 0	
Hudens farve	Alm: 0, bleg: 1, rød: 2, blå (cyanotisk): 3	
Hårlag*	Alm: 0, langt: 1	

		
Sår og skrammer	Skulderrsår	Hvis ja, brug separat skema
Andre sår:	indsæt på tegning med nummer og udfyld for hvert enkelt sår herunder	Størrelse (cm), sårskorpe:1, blødning: 2, rødmen: 3 hævelse:4, puds:5
	1:	4:
	2:	5:
	3:	6:
Skrammer	Antal eller > 15	
(score for hver kropsdel)	Front	Scoren angives samlet for både venstre og højre side for hver kropsdel
	Mellem	
	Bagende	
	Rødme, hævelse, ømhed (hvor: tegn ind som punkt eller område (skravér))	
Hudens elasticitet	Elasticitet (1/0)	Tæl sekunder
Hudtemperatur	Temperatur på lemmer (under knæet) og ører (yderste 3.-del) (varm/kold)	Lemmer: V K Ører: V K
Vulva	Læsion (1/0)	
	Udflåd (1/0)	
	Farve på flåd: (gennemsigtigt: 0, hvidt:1, gult/brunt: 2)	
	Lugt: (1/0)	
Slimhinder	Tryktest, normal: 0, ikke normal: 1	Tæl sekunder
Farve på slimhinde	Alm. lyserøde: 0 Blege: 1 Meget røde: 2 Blålige: 3	
Ben		
Muskelfylde:	Normal på alle 4 ben: 0, unormal på 1 ben: 1, unormal på 2 ell. flere ben: 3	
Hævelser (bursa):	Ingen: 0, 1 ben: 1, 2 eller flere ben: 3	
Klove: i) afrevne	Normale:0, 1 afreven klov: 1 (hvilken), To eller flere afrevne: 2, beskadigede: 3	
ii)Klovlængde	Normale: 0, for lange: 1	Klove: Biklove:

iii)Sår i kronrand	Indtegn på figur og beskriv (som under sår)	
Syn	Normalt: 1, reagerer ikke:0	
Hørelse	Normalt: 1, reagerer ikke:0	
Hvis det er muligt så notér om der er tilblandinger i fæces eller urin (blod, slim) og om konsistensen er normal		

Del 3: Bevægelse:

Halthedskategori	Score	Bemærkning
Går normalt	0	
Går dårligt, men bruger alle 4 ben eller slingrer med bagparten, når den går eller afkorter sine skridt	1	
Alvorligt halt, bruger det halte ben mindst muligt	2	
Bruger ikke det/de dårlige ben eller kan ikke gå	3	

Klinisk undersøgelse af søer i transportprojektet (slagteri)

Besætning:

Sonr:

Sted: Slagteri

Tidspunkt:


Kroppen opdeles i 3 dele: Front (fra tryne til bag skulder), mellemdel (fra bag skulder til hvor låret starter), og bagende.

Del 1: Almen tilstand (inden soen kontaktes på 1-2 meters afstand)

Område/funktion	Parameter	Score/bemærkning
Almenbefindende	Nævn afvigelser	
Respirationsfrekvens	Antal per 30 sekunder	Hvis muligt
Respirationskvalitet	0: normal, 1: anstrengt, 2: overfladisk	Notér hvis vejtrækningen tydeligvis er hurtigere end normalt
Hoved	i) Asymmetri eller hævelser(1/0)	
Hvis soen lægger sig:	Notér tidspunkt, hvis soen lægger sig	

Del 2: (mens soen er fikseret)

Område/funktion	Parameter	Score/bemærkning
Kropstemperatur	°C	>40,5: må ikke transporteres
Bugens form og fylde	i) Normal: 0, Ikke normal: 1	
	iii) Peristaltik, normal: 0, ikke normal (ingen lyd): 1	Hvis muligt
Yver		
	Antal opmalkede patter på hver side	H: V:
	Hævelser: 1, asymmetri: 2, kronisk yverbetændelse (svamp): 3	
	Antal sår og rifter:	
	Ømhed: 1, udflåd: 2 (1: gennemsigtigt, 2: gult/brunt), ingen af delene: 0	
Hudens farve	Alm: 0, bleg: 1, rød: 2, blå (cyanotisk):3	

		
Sår og skrammer	Skuldarsår	Hvis ja, brug separat skema
Andre sår:	indsæt på tegning med nummer og udfyld for hvert enkelt sår herunder	Størrelse (cm), sårskorpe:1, blødning: 2, rødmen: 3 hævelse:4, puds:5
	1:	4:
	2:	5:
	3:	6:
Skrammer	Antal eller > 15	
(score for hver kropsdel)	Front	Scoren angives samlet for både venstre og højre side for hver kropsdel
	Mellem	
	Bagende	
	Rødme, hævelse, ømhed (hvor: tegn ind som punkt eller område (skraver))	
Hudens elasticitet	Elasticitet (1/0)	Tæl sekunder
Hudtemperatur	Temperatur på lemmer (under knæet) og ører (yderste 3.-del) (varm/kold)	Lemmer: V K Ører: V K
Vulva	Læsion (1/0)	
Slimhinder	Tryktest, normal: 0, ikke normal: 1	Tæl sekunder
Farve på slimhinde	Alm. lyserøde: 0 Blege: 1 Meget røde: 2 Blålige: 3	
Ben		
Hævelser (bursa):	Ingen: 0, 1 ben: 1, 2 eller flere ben: 3	
Klove: i) afrevne	Normale:0, 1 afreven klov: 1 (hvilken), To eller flere afrevne: 2, beskadigede: 3	

iii)Sår i kronrand	Indtegn på figur og beskriv (som under sår)	
Hvis det er muligt så notér om der er tilblandinger i fæces eller urin (blod, slim) og om konsistensen er normal		

Del 3: Bevægelse:

Halthedskategori	Score	Bemærkning
Går normalt	0	
Går dårligt, men bruger alle 4 ben eller slingrer med bagparten, når den går eller afkorter sine skridt	1	
Alvorligt halt, bruger det halte ben mindst muligt	2	
Bruger ikke det/de dårlige ben eller kan ikke gå	3	

Klinisk undersøgelse af søer - vejledning

Ved den normale kliniske undersøgelse gennemgås hele dyret metodisk, vigtige organsystemer undersøges, så godt det nu lader sig gøre med øjne, hænder, ører og næse. For at kunne lave gode, sammenlignelige kliniske undersøgelser handler det først og fremmest om at være *systematisk* og at kunne skelne det normale fra det unormale.

Del 1: På afstand inden i har været i direkte kontakt med soen

Almen tilstand (herunder adfærd og smerteytringer) Dyret observeres så vidt muligt i ro og på 1-2 meters afstand. Ved et uforstyrret almenbefindende er dyret normalt interesseret i sine omgivelser. Afvigelser fra det normale så som nedstemthed, apati, abnorme bevægelser, kramper, opstemthed, ophidselse, tænderskæren, trippen, uro, hoste, klagelyde, besvær med at rejse sig, m.v. noteres.

Respirationsfrekvens: Tælles mens dyret står stille ved at iagttage flankens bevægelser. Normalområdet er 8-18 vejtrækninger/min. Respirationens kvalitet noteres fx overfladisk (bruger kun brystkassen), anstrengt (bevægelse helt ned i bugen).

Huld: Vurderes med visuel inspektion og palpering af bagparten. Søers huld kan vurderes på en skala på 1-4. Der må gerne bruges halve karakterer



Hoved: Hovedet inspiceres for i) asymmetri, ii) hævelser, og iii) flåd fra næsen. I) og ii) scores som enten/eller. iii) scores som 0: ingen flåd, 1: gennemsigtig flåd, 2: gult/grønt flåd.

Hvis soen ligger ned, så få hende op at stå. Kan hun rejse sig normalt? Bemærk om der ved rejse sig bevægelsen er prolaps fra vulva og endetarm, dvs. om der hænger noget udenfor.

Del 2: når soen evt. er fikseret

Kropstemperatur: Måles rektalt. Normalværdier 38,5-39,5 °C (subfebril 39,5-40,5). Hvis søerne har over 40,5, må de ikke transporteres.

Hjerterate: Normalværdier 60-80/min, palperes på a. femoralis, hvilket dog kan være svært, alternativt tælles hjerterefrekvensen ved direkte auskultation (stetoskop). Tæl antal slag per 20 sekunder. Det eksakte antal slag noteres.

Respiration: Den normale respirationslyd er en blød ffff-lyd. Lungebetændelser og andre lidelser i lungerne vil give en hårdere, ru kkkk-lyd (hør denne lyd ved at lægge stetoskopet på jeres egne luftrør). Ved sygdomme i lungerne kan der også lejlighedsvis høre mislyde som fx rallen eller knirken. Lyt på begge sider.

Bugens form og fylde: i) Bugens form og fylde vurderes og bugvæggen palperes. Noter hvis bugens form er unormal: asymmetrisk eller opknebet bug. ii) Er der brok. Hvis ja, angiv størrelsen: Mål fra bugen og ned og omkredsen på det tykkeste sted. iii) Der auskulteres for tarmperistaltik over begge flanker. Det er unormalt, hvis der ikke er lyde fra tarmene.

Yver:

i) Yverbetændelse. Hævelse af én eller flere kirtler, rødme af én eller flere kirtler, hårdhed og smerte i hele kirtelrækken

ii) Antal opmalkede pletter på hver side: pletter med mælk, der dog ikke behøver, at være helt spændt ud. Hvis pletten er ren er det også tegn på, at den er malket op.

iii) Afstand fra gulv til nederste patte

iiii) Er der hævelse/yverbetændelse, asymmetri eller knudrede områder (svamp=kronisk yverbetændelse: hævede, hårde og eller knudrede kirtler (se billede)



v) Tjek om der er sår eller rifter (sår < 1 cm i diameter, rifter > 5 cm lange).

vi) Ømhed: Berør soen hele vejen ned langs mælkelisten med en fast hånd, hvis der er områder der varme og røde, så tryk for at tjekke for patteudflåd (1: gennemsigtigt, 2: gult/brunt), der ikke er mælk. Ømhed= kraftig reaktion på berøring.

Hudens farve: Her menes overordnet – altså hele soens farve.

Hårlag: Længere tids sygdom vil give synlige ændringer i form af lang, strid, mat, tynd pels.

Prolapser: Er der prolaps fra vulva eller endetarmsåbningen og er prolapsen tilstede hele tiden? Hvor mange centimeter hænger ud?

Sår og skrammer: Huden undersøges meget nøje med henblik på sår og skrammer.

i) skuldarsår: Hvis der er skuldarsår bruges separat skema, hvor der er yderligere forklaringer.

ii) Andre sår: **Definition: Et hul i huden på > 1 cm i diameter.** Hele kroppen gennemgås. Sårerne lokaliseres og indtegnes på tegning for oven med nummer. For hvert sår noteres følgende Størrelse (diameter i cm), sårskorpe (+/-), blødning (+/_ den mindste dråbe), rødmen (+/-), hævelse (+/-). Gult puds (+/-) Sår i kronranden og mellem klovene registreres separat (se nedenfor).

iii) Skrammer: **Definition: Ridse i huden > 5 cm.** For hver kropsdel (samlet for højre og venstre side) tælles antal skrammer, der skelnes ikke mellem nye og gamle skrammer. De opgives i kategorier (se skema)

iv) Anden rødme eller hævelse (vis på tegning med bogstav)

v) Hudens elasticitet: Hudens elasticitet vurderes ved at trække en hudfold ud bag øret – nedsat elasticitet ses ved dehydrering.

vi) Temperatur på lemmer og ører: Hudtemperaturen vurderes på lemmer (under knæet) og på den yderste tredjedel af øret (normalt lidt lavere end på kroppen).

Vulva: i) Vulvaåbningen inspiceres for læsioner efter faring eller vulvabid. Det vurderes om læsionen er frisk (friskt blod). Hvis der er flåd fra vulva noteres ii) farve, iii) lugt, mængde (notér, hvis der er mere end normalt). Normalt flåd i forbindelse med cyklus er lugtløst, mens patologisk flåd om regel lugter).

Slimhinder: De tilgængelige slimhinder er mundhuleslimhinde, øjets slimhinde og vulvaslimhinden. Svin er normalt ikke særligt positivt stemt for at blive kigget i munden, så vulvaslimhinde er at foretrække. Slimhinder skal være af normal lyserøde, fugtige og uden læsioner. Kig på jeres egne hvis I er tvivl om farven. Blege slimhinder tyder på anæmi, blållilla tyder på kredsløbsinsufficiens, stærkt røde på intoxication. Bemærk desuden om der er flåd fra øjnene. Kapillærfyldningstiden måles på vulvaslimhinden ved at presse en finger hårdt mod slimhinden (brug en anden finger som hårdt underlag) i 5 sekunder og derefter vurdere hvor hurtigt blodet løber tilbage og vævet genvinder sin naturlige farve. Skal være højst 2 sekunder.

Ben: i) Vurdér muskelfylde og symmetri. Efter længere tids halthed kan der ses atrofi af muskulaturen. ii) Undersøg og palpér lemmer et ad gangen for hævelse og ømhed.

Klove: i) Undersøg klove og biklove. Hvis biklovene rører jorden er de for lange. Der kommer et billede af for lange klove. Er der en eller flere afrevne klove. ii) Vurdér længde. iii) Beskriv sår i kronranden

Syn: Reagerer soen normalt på ting i synsfeltet

Hørelse: Reagerer soen normalt på pludselige lyde

Halthed og bevægeapparatet: Hos søer skyldes halthed skyldes oftere ledproblemer end klovproblemer. Kan soen rejse sig ved egen hjælp? Støtter hun ligeligt på alle 4 ben og er bevægelsen fri og uhæmmet? Ved smerte vil soen ofte stå med krummet ryg og understillede ben. Til vurdering af halthed bruges følgende skala:

0 = går normalt

1 = går dårligt, men bruger alle 4 ben eller slingrer med bagparten, når den går eller afkorter sine skridt

2 = alvorligt halt, bruger det halte ben mindst muligt

3 = bruger ikke det/de dårlige ben eller kan ikke gå

Skuldersårskema

Først: Sørg for at soen står op. Find hudområde svarende til størrelse på håndflade med spina scapula i midten. Al undersøgelse rettes mod dette område (Spina scapula = punkt på skulderen hvor knoglen mærkes)

Spørgsmål	Aktuelt svar	Mulige svar	Bemærkninger
1. Hvor mange sår?		Antal sår: 1, 2,...	Sammenhængende sårskorpe $\Rightarrow$ samme sår
2. Hvilke slags sår er der? Må gerne sætte flere krydser i denne rubrik		Tryksår Andre sår Kan ikke afgøres	Tryksår = forholdsvis rund og relativt afgrænset sår i det undersøgte område.
3. Er huden i området rød? Hvis ja, er det afgrænset rødme?		Ja/nej/ved ikke Ja/nej/ved ikke	Sammenlign med huden udenfor området. Hvis huden udenfor området også er rød, så svares nej Afgrænset = sammenhængende, dvs ikke f.eks. udslæt
4. Er soens skuldre asymmetriske?		ja/nej/ved ikke	Ved asymmetri er der forskel på højre og venstre skulder set og/eller følt ovenfra. Soen skal stå normalt på alle ben
5. Er hudområdet hævet?		Ingen hævelse Blød Hård som knogle Ved ikke	Bedømmes både ved at se og føle det undersøgte område.
6. Er der sårskorpe på?		ja/nej/ved ikke	Rødbrun, hård og fortykket hud. Krads forsigtigt: kan det løsnes let (=snavs, eller ubetydelig sår), så ingen sårskorpe
7. Er der rødme omkring såret?		ja/nej/ved ikke	Huden helt tæt på såret er rød sammenlignet med huden uden for det undersøgte område.
8. Sårets diameter (sårrand til sårrand)		Antal cm	Brug transparent "cirkulær lineal". Mål på sårets bredeste og smalleste sted. Angiv den diameter, hvorunder såret netop kan være
9. Score, når der måles med "skuldersårsmåler"			

Analyse af transport- og so-relaterede faktorerers betydning for forværring i søernes tilstand

Analysen af so- og transportrelaterede faktorerers betydningen for forværringen i de udvalgte kliniske mål blev foretaget i 3 trin beskrevet nedenfor. De kliniske mål var: antal skrammer i alt, antal skrammer på forparten, antal sår, antal områder på kroppen med hævelser eller rødme, hudelasticitet og halthedsscore.

Trin 1

Til at identificere hvilke variable, der havde betydning for forværringer i de udvalgte kliniske mål, anvendte vi en række simple variansanalyser. På grund af det store antal mulige forklarende variable, var det ikke muligt at lave én model med alle forklarende variable. I stedet analyserede vi indledningsvist de udvalgte kliniske mål i en række variansanalyser – én for hver potentiel responsvariabel. I modellerne til disse analyser indgik også før-værdien for det kliniske (målt i besætningen) som forklarende variabel, og transportdatoen, der også beskriver variation mellem besætninger (da der kun var én tur per besætning per dag), som en tilfældig effekt. Dette indledende trin blev lavet i statistikprogrammet R. I Tabel 1 ses de forklarende variable, der blev anvendt i hver sin model. Efter hver variabel er det angivet om variabelen indgik i modellen som en kontinuert (k), eller som en kategorisk variabel (g).

De forklarende variable, der i dette indledende trin havde mindst én signifikant effekt på en responsvariabel ($P < 0,05$), gik videre til analysens næste trin

Trin 2

Variable markeret med* i Tabel 1, havde en signifikant effekt på mindst én af de analyserede kliniske mål, og gik videre til analysens 2. trin.

I trin 2 opstillede vi 2 modeller, der henholdsvis havde forklarende variable, der beskrev soens tilstand før transporten og transportrelaterede faktorer. I begge modeller indgik desuden før-værdien for responsvariabelen (målt i besætningen) som forklarende effekt og transportdatoen som tilfældig effekt (Tabel 2). Transportmodellen blev tilføjet responsvariable der beskrev temperaturforholdene under transporten.

For ikke-normalfordelte variable brugte vi en generaliseret lineær mixed model (PROC GLIMMIX, SAS), hvor responsvariabelen var omregnet til en binær variabel (kun 2 mulige udfald), der enten angav om den kliniske tilstand var forværret eller ikke-forværret. Med denne analyse estimeres sandsynlighederne og odds for de to udfald. De kontinuerte, normalfordelte variable blev både analyseret i en lineær mixed model (R) og i en generaliseret lineær mixed model, som beskrevet ovenfor.

Modellerne blev reduceret trinvist, hvis P-værdierne for de enkelte forklarende variable oversteg 0,05. Alle elementer der havde en signifikant effekt på mindst én responsvariabel, gik videre til næste trin.

Tabel 1. Responsvariable testet i hver sin model, for identifikation af mål, der påvirker ændringer i søernes transportegnethed. Nogle variable indgik som kontinuerte (k), nogle som kategoriske variable (grupperet, g), og nogle som begge dele (dog ikke på samme tid). Anvendte gruppevariable er defineret. Variable markeret med* havde en signifikant effekt på mindst én af de analyserede kliniske mål.

Trin 1			
Enkeltvis analyse af forklarende variable			
Sorelaterede	Definition af gruppevariable	Transportrelaterede	Definition af gruppevariable
Huld (g)*	1: 2 + 2,5 2: 3 + 3,5 3: 4 + 4,5	Varighed (g, k)*	1: <115 min 2: 116-235 min 3: 236-325 min 4: > 325 min
Paritet (g)*	1: læg 1 + 2 2: læg 3-5 3: > 6. læg	Afstand(g, k)*	1: 29-70 km 2: 71-130 km 3: 131-170 km 4: 171-260 km 5: 261-300 km 6: 301-400 km
Antal opmalkede patter (g, k)* (laktationsstatus)	1: opmalkede patter 0: ingen opmalkede patter	Antal stop (g, k)*	0: 0 stop 1: 1 el. 2 stop 2: > 2 stop
Afstand fra yver til gulv (k)			
Halthedsscore (g)*	(0, 1, 2,3,4)	Samlet varighed af stop (g)*	1: 0 min., ingen stop 2: 0-29 min. 3: ≥ 30 min.
Kropstemperatur (k)*		Ventetid i lastbil på slagteriet (k)*	
Hjerterate (k)*			
Afrevne klove eller biklove (g)*	(1/0)		
For lange klove eller biklove(g)*	(1/0)		
Vulvalæsion(g)*	(1/0)		
Vulvaflåd (g)*	(1/0)		
Lugt fra vulva (g)*	(1/0)		
Respirationsfrekvens (k)			
Respirationskvalitet (g)	0: normal 1: ikke normal		
Yverbetændelse (g)	(1/0)		
Kolde ører (g)*	(1/0)		
Kolde lemmer (g)*	(1/0)		

Tabel 2. Responsvariable der indgik i henholdsvis transportfaktor- og sofaktormodellen. Nogle variable indgik som kontinuerte(k), nogle som kategoriske variable (g), og nogle som begge dele (dog ikke på samme tid). Anvendte gruppevariable er defineret.

Trin 2			
Transportfaktormodel		Sofaktormodel	
Forklarende variable		Forklarende variable	
Varighed (g, k)	gruppevariable som i Tabel 1	Paritet (g)	gruppevariable som i Tabel 1
Afstand (g, k)	gruppevariable som i Tabel 1	Huld (g)	gruppevariable som i Tabel 1
Antal stop (g, k)	gruppevariable som i Tabel 1	Afstand fra yver til gulv (k)	
Total varighed af stop (g)	gruppevariable som i Tabel 1	Antal opmalkede patter (g) (laktationsstatus)	gruppevariable som i Tabel 1
Ventetid på slagteri (k)		Halthedsscore (g)	gruppevariable som i Tabel 1
Gennemsnitlig temperatur (k)		Kolde ører (g)	gruppevariable som i Tabel 1
Antal min. > 15 °C (k)		Kolde lemmer (g)	gruppevariable som i Tabel 1
Std. for temperatur (k)		Kropstemperatur (k)	
Maksimal temperatur (k)		Vulva_total (g)	0: normale forhold 1: enten læsion, udflåd eller lugt
Interaktion ml. varighed og gns. temperatur		Klove_total (g)	0: normale forhold 1: enten for lange eller afrevne klove eller biklove,
Interaktion ml. afstand og gns. temperatur			
Før-værdien af responsvariablen indgik som forklarende effekt i begge modeller			
Transportdato indgik som tilfældig effekt i begge modeller			

Trin 3

I trin 3 opstillede vi den endelige model, der bestod af både transport- og sorelaterede mål (Tabel 3). Alle analyser blev foretaget med en generaliseret lineær mixed model (PROC GLIMMIX, SAS), som beskrevet under Trin 2. For hvert klinisk mål undersøgte vi indledningsvist om der var en lineær sammenhæng med de kontinuerte forklarende variable (f.eks. varighed af transport og temperatur). Hvis dette ikke var tilfældet, indgik den forklarende variable som en kategorisk variabel, og ellers som kontinuert.

Da transporttid og transportvarighed var højt korrelerede, valgte vi kun at anvende transportvarigheden i trin 3. De kliniske mål blev analyseret i begge modeller, der blev reduceret trinvis ved P-værdier over 0,05.

Tabel 3. Den endelige model indeholdende både faktorer, der beskriver transporten og soens tilstand målt i besætningen før afgang.

Trin 3	
Endelig model	
Forklarende variable	
Varighed (g eller k)	gruppevariable som i Tabel 1
Antal stop (k)	
Total varighed af stop (g)	gruppevariable som i Tabel 1
Gennemsnitlig temperatur, under transport (g, k)	1: < 6,5 °C 2: 6,5-13 °C 3: 13-18 °C 4: >18 °C
Gennemsnitlig temperatur, ventetid på slagteri (g, k)	1: < 11 °C 2: 11-15 °C 3: 15-19,5 °C 4: >19,5 °C
Antal min. > 15 °C (k)	
Maksimal temperatur (k)	
Std. for temperatur (k)	
Ventetid på slagteri (k)	
Interaktion ml. varighed og gns. temperatur	
Interaktion ml. ventetid og gns. Temperatur i ventetid	
Paritet (g)	gruppevariable som i Tabel 1
Huld (g)	gruppevariable som i Tabel 1
Laktationsstatus (g)	1: opmalkede patter 0: ingen opmalkede patter
Halhedsscore (g)	gruppevariable som i Tabel 1
Kropstemperatur (k)	
Vulva_total (g)	0: normale forhold 1: enten læsion, udflåd eller lugt
Klove_total (g)	0: normale forhold 1: enten for lange eller afrevne klove eller biklove
Før-værdien af responsvariablen indgik som forklarende effekt i begge modeller	
Transportdato indgik som tilfældig effekt i begge modeller	